

小児期ADHD
(18歳未満)

アトモキセチン内用液0.4% 「トローワ」の飲み方タグ

このくすりは飲み始めから徐々に量を増やし、3段階にかけて適切な服用量(維持量)にします。

くすりの飲み方タグは、朝と夕の服用量を書き込み、ボトルと一緒に保管することで、服用量の間違いを防ぐためのものです。

くすりを処方されたときに指示された服用量、服用期間をくすりの飲み方タグに書き込みます。

服用期間を終えた欄は廃棄します。

次に指示された服用量、服用期間を新しい欄(1つ上の欄)に書き込みます。

くすりの飲み方タグ

アトモキセチン内用液0.4%「トローワ」のボトルの口にかけてお使いください。

4 月 日 ~ 月 日
朝 mL/回 夕 mL/回

3 月 日 ~ 月 日
朝 mL/回 夕 mL/回

2 月 日 ~ 月 日
朝 mL/回 夕 mL/回

1 月 日 ~ 月 日
朝 mL/回 夕 mL/回



服用量を書き込んだタグはボトルの口にかけて、この状態で保管してください。

- くすりの飲み方タグは台紙からミシン目に沿って切り取ってお使いください。
- タグは下から1枚ずつ使用し、使い終わってから次のタグをお使いください。

くすりの飲み方タグ

アトモキセチン内用液0.4%「トローワ」のボトルの口にかけてお使いください。

4 月 日 ~ 月 日
朝 mL/回 夕 mL/回

3 月 日 ~ 月 日
朝 mL/回 夕 mL/回

2 月 日 ~ 月 日
朝 mL/回 夕 mL/回

1 月 日 ~ 月 日
朝 mL/回 夕 mL/回

くすりの飲み方タグ

アトモキセチン内用液0.4%「トローワ」のボトルの口にかけてお使いください。

4 月 日 ~ 月 日
朝 mL/回 夕 mL/回

3 月 日 ~ 月 日
朝 mL/回 夕 mL/回

2 月 日 ~ 月 日
朝 mL/回 夕 mL/回

1 月 日 ~ 月 日
朝 mL/回 夕 mL/回