

リセドロン酸Na錠75mg「トーフ」 を服用されている方へ

この薬は毎月1回1錠飲む薬です。

(毎日、毎週飲む薬ではありません。)

毎月 日に飲みましょう

毎月1回、決められた日に1錠を下記の手順で飲んでください。

朝、起きたとき(食事前)

に、1錠をコップ1杯
(約180mL)の水^注
で飲んでください。



注) 水道水や市販の水(Ca、Mg等の
含量の特に高いミネラルウォーター
を除く)で飲んでください。

飲んでから30分間は
横にならず、水以外の
飲食、他の薬の服用は
さけてください。



この薬をかんだり、口の中で溶かしたりしないでください。

薬を飲み忘れたとき

その日は飲まないで次の朝に1錠飲んでください。

(何も飲んだり食べたりしていない場合は気がついたときにすぐ
に1錠飲んでください。)

その後はあらかじめ決められた日に飲んでください。

決して2回分を一度に飲まないでください。

裏面もお読みください。

➤ この薬を飲み始めたころに、インフルエンザ様症状があらわれることがあります。

- 発熱、背中の痛み、頭痛、吐き気、だるさ、関節痛、筋肉痛、手足の痛み、力が入らない など

➤ この薬の服用により、以下のような症状があらわれることがあります。

- 食べ物が飲み込みにくい、飲み込むときにのどが痛い、胸に痛みを感じる など
- 体がだるい、力が入らない、食欲不振、発熱、皮膚や白目が黄色くなる など
- あごの痛みやしびれ・だるさ、歯ぐきのはれ、歯のぐらつき など
- 外耳炎、耳だれ、耳の痛みが続く など
- 太ももや太ももの付け根の痛み

このような症状があらわれたり、異常を感じた場合は、すみやかに医師または薬剤師に相談してください。

歯科治療を受けられる方は、必ず歯科医、口腔外科医にこの薬を服用していることをお申し出ください。

ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ち、定期的に歯科検査を受けてください。

スマートフォン用
薬の情報



<http://twyh.jp/ris-t75/>

東和薬品株式会社