


モメタゾン点鼻液50 μ g「トーフ」56噴霧用・112噴霧用 を 使用される方へ

よりよい効果を得るために毎日継続して使いましょう。

- ・この使用説明書をよく読んで使用してください。
- ・医師に指示された用法・用量を守って使用してください。
- ・容器の先端の噴霧口を針やピンなどで突かないでください。
破損し、噴霧できなくなります。




◆ 準備

1




鼻をかんで、
鼻の通りをよくしてください。

2



初回時含め、使用する前に
毎回必ず容器をゆっくり振ってください。
「容器を振る」ことにより、
サラサラの液体になり、正しく噴霧できます。


3



キャップをはずし、
イラストのように、しっかりと持ってください。

新しい容器を使い始めるとき

初めて使用するときは、
空打ちを10回程度行い、
液が霧状になったことを確認してから
使用してください。



◆ 噴霧

用法: 12歳以上

1日1回**2**噴霧ずつ



少しうつむいた姿勢で、ノズルの先を鼻腔に入れ、左右の鼻腔に1回ずつ噴霧してください。



薬が鼻の奥まで行きわたるように、鼻から息を吸って口から吐いてください。



もう一度、左右の鼻腔に1回ずつ噴霧してください。



薬が鼻の奥まで行きわたるように、鼻から息を吸って口から吐いてください。

用法: 12歳未満

1日1回**1**噴霧ずつ



少しうつむいた姿勢で、ノズルの先を鼻腔に入れ、左右の鼻腔に1回ずつ噴霧してください。



保護者が行う場合は、イラストのように噴霧してください。



薬が鼻の奥まで行きわたるように、鼻から息を吸って口から吐いてください。

◆ 噴霧の後

- 使用後はティッシュペーパーなどで容器の先端を拭いて、キャップをしてください。
- 直射日光を避け、室温で保管してください。