

ガランタミンOD錠「トローワ」を 服用される方とご家族・介護者の方へ

この薬について

- アルツハイマー型認知症の症状の進行を遅らせる薬です。
- 医師の指示に従って、決められた量を服用してください。
- この薬を飲みはじめるときは、体を薬に慣らすために次のように服用します。

最初の4週間は**1日8mg(1回4mgを1日2回)**を服用します。



4週間後から**1日16mg(1回8mgを1日2回)**を服用します。



その後、症状に応じて**1日24mg(1回12mgを1日2回)**まで
増量することもあります。

- 薬の量を増やすのは、症状が悪化したからではありません。
- 医師の指示なく服用を止めてしまうと、認知機能が悪化することがあります。患者さん本人や家族の判断で服用を中止したり、量を変更したりせず、医師の指示通りに服用してください。

この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。

- 舌の上で唾液を含ませ軽くつぶしてから、唾液と一緒に飲み込んでください。
- 水なしで飲むときは、寝たままでは飲まないでください。
- 普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。
どちらの飲み方でも効き目は変わりません。

服用にあたっての注意事項

- 次のような症状があらわれたり、いつもと違うと感じたら、医師または薬剤師に相談してください。



吐き気



食欲の低下



便が軟らかくなる、下痢



頭痛

- 一般に、吐き気等の消化器症状は、食後に投与することで軽減される可能性がありますので、食後に服用するようにしてください。
- アルツハイマー型認知症では、自動車の運転などの機械操作能力が低下する可能性があります。また、薬によって、めまい、眠気などがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に注意してください。
- 用法・用量を間違わないように、薬は医療従事者やご家族、介護者が管理してください。

保管上の注意

- 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。
- 湿気を避けて、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。

東和薬品株式会社