

メマンチンOD錠/錠「トーフ」を服用される方とご家族・介護者の方へ

この薬について

- アルツハイマー型認知症の症状の進行を遅らせる薬です。
- 医師の指示に従って、決められた量を服用してください。
- この薬を飲みはじめるときは、体を薬に慣らすために次のように服用します。

服用スケジュール



1日1回5mgから開始し、1週間ごとに5mgずつ服用する量を増やします。4週目以降は、1日1回20mgを服用します。

- 薬の量を増やすのは、症状が悪化したからではありません。
- 症状に変化がないように見えても、実際は病気の進行を遅くしていると考えられますので、ご自身やご家族の判断で服用をやめたり、薬の量を加減したりしないでください。
- 指示どおりに飲み続けることが大切です。

OD錠を服用される方へ

この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠（OD錠）です。

- 舌の上で唾液を含ませ軽くつぶしてから、唾液と一緒に飲み込んでください。
- 水なしで飲むときは、寝たままでは飲まないでください。
- 普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。どちらの飲み方でも効き目は変わりません。

（裏面もお読みください）

服用にあたっての注意事項

- 飲みはじめには、めまいや眠気があらわれることがあります。これらの症状により転倒することがありますので、注意してください。
- アルツハイマー型認知症では、自動車の運転などの機械操作能力が低下する可能性があります。また、薬によって、めまい、眠気などがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないでください。
- 服用中に気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 用法・用量を間違わないように、薬は医療従事者やご家族、介護者が管理してください。

保管上の注意

- 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。
- 湿気を避けて、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。