

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2020年3月

東和薬品株式会社

HMG-CoA還元酵素阻害剤  
－高脂血症治療剤－

日本薬局方

シンバスタチン錠

シンバスタチン錠5mg「トーワ」

シンバスタチン錠10mg「トーワ」

シンバスタチン錠20mg「トーワ」

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせいたします。  
今後のご使用に際しましては、改訂内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容 (\_\_\_\_\_: 追記)

改訂後			改訂前		
<b>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】</b> 4) イトラコナゾール、ミコナゾール、 <u>ポサコナゾール</u> 、 <u>アタザナビル</u> 、サキナビルメシル酸塩、テラプレビル、コビシスタットを含有する製剤、オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビルを投与中の患者（「相互作用」の項参照）			<b>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】</b> 4) イトラコナゾール、ミコナゾール、アタザナビル、サキナビルメシル酸塩、テラプレビル、コビシスタットを含有する製剤、オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビルを投与中の患者（「相互作用」の項参照）		
<b>3. 相互作用</b> 1) 併用禁忌（併用しないこと）			<b>3. 相互作用</b> 1) 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
イトラコナゾール イトリゾール ミコナゾール フロリード <u>ポサコナゾール</u> <u>ノクサフィル</u>	急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。	これらの薬剤はCYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。	イトラコナゾール イトリゾール ミコナゾール フロリード	急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。	これらの薬剤はCYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。
<b>2) 併用注意（併用に注意すること）</b>			<b>2) 併用注意（併用に注意すること）</b>		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
<u>ダブトマイシン</u>	併用した場合CK(CPK)が上昇する可能性があることから、 <u>ダブトマイシン投与中は本剤の休薬を考慮すること。</u>	<u>機序不明</u>		(該当する記載なし)	

## 2. 改訂理由

「禁忌」「相互作用 併用禁忌」「相互作用 併用注意」の項（自主改訂）

相互作用の相手薬剤と整合性をとるため、改訂いたしました。

---

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.288（2020年4月）に掲載の予定です。

最新添付文書は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp>）及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>）に掲載いたします。

---

製造販売元

**東和薬品株式会社**

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

 0120-108-932