




アトモキセチン内用液 0.4%「トーワ」 使用説明書変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、アトモキセチン内用液 0.4%「トーワ」の使用説明書を変更致しますのでご案内申し上げます。

記

【変更内容】

使用方法⑤、⑦の説明文および⑦のイラスト部分の変更（表面の変更はございません）

変更前		変更後	
裏面	 <p>片手でボトルを押さえ、もう一方の手でビレットを握って取り外してください。</p>	裏面	 <p>片手でボトルを持ち、アダプター部分を押さえながらもう一方の手でビレットを握って<u>ゆっくりと</u>取り外してください。</p>
 <p>1.6 mL計量の場合 1.6のラインをこの位置に合わせます。</p> <p>しっかり握ってください。</p> <p>ビレットが抜けないようにボトルとビレットを片方の手のひらで包み込むように握ってください。取りたい用量までピストンを引いてください。</p>	 <p>ボトルを平らなところに置きます。大きな気泡が入っていた場合は、ゆっくりとピストンを押し薬液を全て戻し、手頭からやり直してください。</p>	 <p>1.6 mL計量の場合 1.6のラインをこの位置に合わせます。</p> <p>しっかり握ってください。</p> <p>ビレットが抜けないようにボトルとビレットを片方の手のひらで包み込むように握ってください。取りたい用量まで<u>ゆっくりと</u>ピストンを引いてください。</p>	 <p>ボトルを平らなところに置きます。大きな気泡が入っていた場合は、ゆっくりとピストンを押し薬液を全て戻し、手頭からやり直してください。</p>
 <p>お子さまにビレットをくわえさせ、飲み込みやすいようにゆっくりとピストンを押ししてください。</p> <p>服用時の留意点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・のどの奥までビレットを入れないように注意してください。 ・苦味があるので、口に入れたらすぐに飲み込ませてください。 <p>使用後、アダプターを付けたままキャップを閉めて保管してください。</p>	 <p>ビレットから直接飲むことが難しい場合は、カップに移し替えてそのまま飲ませてください。</p> <p>カップ移し替え時の留意点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・液はねしないようにビレットはカップの側面に付けて、<u>ゆっくりと</u>ピストンを押しってください。 <p>使用後はビレットを水洗いの上、自然乾燥させてください（洗剤では洗わないでください）。</p>	 <p>お子さまにビレットをくわえさせ、飲み込みやすいようにゆっくりとピストンを押ししてください。</p> <p>服用時の留意点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・のどの奥までビレットを入れないように注意してください。 ・苦味があるので、口に入れたらすぐに飲み込ませてください。 <p>使用後、アダプターを付けたままキャップを閉めて保管してください。</p>	 <p>ビレットから直接飲むことが難しい場合は、カップに移し替えてそのまま飲ませてください。</p> <p>カップ移し替え時の留意点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・液はねしないようにビレットはカップの側面に付けて、<u>ゆっくりと</u>ピストンを押しってください。 <p>使用後はビレットを水洗いの上、自然乾燥させてください（洗剤では洗わないでください）。</p>
東和薬品株式会社	2019年2月作成(S-2)	東和薬品株式会社	2019年3月作成(S-3)

【包装単位、変更ロット(使用期限)および出荷予想時期】

包装単位	変更ロット (使用期限)	出荷予想時期
100mL×1 瓶	A0017 (2022/6)	2020年5月中旬

流通状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がございますこと、ご了承下さい。

以上