

バルデナフィル錠「トーフ」を服用される方へ

この薬を安全に使用するため飲む前に必ずお読みください。

- 重篤な副作用の発生を未然に防ぐため、下記の病気で治療を受けている時は、飲んでいる薬を医師に必ず伝えてください。薬によっては、併用できないものがあります。

・狭心症（硝酸剤：ニトログリセリンなど）、不整脈、
肺高血圧症（リオシグアト）、HIV感染症、水虫など
の皮膚の病気（イトラコナゾール）の治療

S-1

- 医師の処方に従って飲んでください。決して自分で量を増やしてはいけません。必ず1日1回までの服用としてください。次に飲むときは24時間以上あけて飲んでください。

裏面もご覧ください。

バルデナフィル錠「トローワ」を服用される方へ

- この薬の服用後に視力が低下することがあります。眼の異常に気付かれた場合は服用を中止し、すぐに医師または眼科医を受診してください。
- この薬はあなたに処方されたものです。決して他の人に渡さないでください。
- 医師の指示により5mgを服用する場合は、10mg錠を半分に割って服用してください。
- この他の注意事項について聞きたい場合や、わからないことがある場合には、医師または薬剤師に相談してください。

DC-000110

東和薬品株式会社 2020年5月作成(S-1)