

バルデナフィル錠「トローワ」を 適正にご使用いただくために

患者さんとパートナーの方のために

この薬を服用する際には、注意しなければならない
点がありますので、お薬を飲む前にこのパンフレット
を必ずお読みください。



バルデナフィル錠「トローワ」を
飲む前に…



あなたにバルデナフィル錠「トーワ」が処方されました。

診察をうける際に、あなたの症状や過去および現在の他の病気・薬剤について、医師にすでに十分に話されましたでしょうか？

バルデナフィル錠「トーワ」は、障害されたあなたの勃起機能を改善するための薬ですが、飲み方を誤ると、**重大な副作用があらわれる**ことがあります。

この冊子には、バルデナフィル錠「トーワ」に関する大切な情報が記載されていますので、この薬をお飲みになる前に、必ずお読みください。さらに、お聞きになりたいことがある場合は、医師または薬剤師までおたずねください。

つぎの方は服用しないでください。

この薬は、すべての方に適するわけではありません。**硝酸薬** (飲み薬・舌下錠・貼り薬・注射・吸入薬・塗り薬・スプレーなど)を使っている方は、この薬を絶対に服用しないでください。

例えば、狭心症の発作の治療によく処方されるニトログリセリン (硝酸薬)を飲んでいたり、貼り薬を貼っている方、吸入している方などは、血圧が危険なレベルまで下がり、場合によっては死に至るおそれがあります。

また、他にも飲んでいたりする薬があれば、必ずそのことを医師または薬剤師にお話してください。

性行為は心臓に負担をかけます。この薬を飲む前に、健康状態について医師とよく話しましょう。とくに心臓に関する持病のある方 (狭心症や重度の心血管系障害・心不全など) や脳血管に病気のある方 (脳出血、脳梗塞など) は、必ず医師にご相談ください。

もし、服用後に発作が起きたら…。

今まで狭心症と診断されたことがない方でも、性行為中に狭心症の発作を起こす場合があります。本剤を服用後、狭心症が起きた場合の治療法の選択には十分な配慮が必要となります。場合によっては、一般に発作の治療によく用いられている硝酸薬が使用できず、他の薬剤を用いなければならないことがあり、その際には、硝酸薬と同じ効果が得られないことがありますことをご承知おきください。

また、発作の治療を受ける際には、発作治療薬の選択のために、必ず本剤を服用した時間を医師にお伝えください。

発作時に自ら医師に伝えられない場合もありますので、パートナーにもあらかじめ本剤を服用していることを伝え、救急医療機関を受診する際には、医師などに「バルデナフィル錠「トロー」を服用している」ことが必ず伝わるようにしてください。

ご本人、パートナー、家族の方々が、バルデナフィル錠「トロー」服用の事実を医師に告げられない場合には、狭心症等の治療のために硝酸薬が使用され、血圧が危険なレベルまで下がり、場合によっては死に至るおそれがあります。したがってパートナーの方に必ず本剤を服用していることを伝えてください。

つぎの方は服用しないでください。

今までに、バルデナフィル製剤を服用してアレルギー（過敏症）を起こした方

心血管系障害などのために医師から性行為が不適當だと診断された方

先天的に不整脈がある方、抗不整脈薬*を使用中の方

最近6ヵ月以内に脳梗塞・脳出血や心筋梗塞を起こした方

重い肝障害のある方

血液透析が必要な腎障害のある方

低血圧の方（安静時の最高血圧 $<90\text{mmHg}$ ）や治療による管理がなされていない高血圧の方（安静時の最高血圧 $>170\text{mmHg}$ または安静時の最低血圧 $>100\text{mmHg}$ ）

不安定狭心症のある方

リオシグアト、抗ウイルス薬* (HIV 治療薬)、抗真菌薬*
(外用除く) を使用中の方

網膜色素変性症 (進行性の夜盲) と診断された方

* 詳しい薬の名前は、医師または薬剤師にご相談ください。
(参考:P14 主な併用禁忌薬剤名リスト)

また、肝臓の病気、赤血球の異常 (鎌状赤血球性貧血)、多発性骨髄腫、白血病、血が止まりにくい病気、胃・十二指腸潰瘍、ペニスに関する病気または奇形のある方、他の勃起不全治療薬・勃起補助器具を使用している方や手術を受けた方も、**必ず医師にご相談ください。**


副作用があらわれたときは、 医師または薬剤師にご相談を。

この薬の服用後に視力が急激に低下することがあります。眼の異常に気付かれた場合は服用を中止し、すぐに医師または眼科医を受診してください。

また、この薬によって、「ほてり」、「頭痛」、「消化不良」、「はき気」、「鼻づまり」、「動悸」などの副作用があらわれることがあります。

この薬の服用後、めまいや視覚障害（眼のかすみ・物が青く見えたり、まぶしく見える）があらわれることがありますので、自動車や機械の運転操作をする場合にはご注意ください。

聴覚に異常を感じた方は、服用を中止し、医師にご相談ください。



こうした症状の他にも、副作用があらわれることがありますので、異常を感じたときには服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。


なお、勃起の持続によってペニスが損傷し勃起機能を永続的に失うことがありますので、バルデナフィル錠「トーワ」服用後4時間以上勃起が続く場合は、すぐに医師に連絡してください。

他の人にあげるのは厳禁です。

この薬は、あなたのために処方された薬です。

パートナーや他の人に絶対あげないでください。その人が性行為をするには不適當な病気（心臓病など）にかかっていたり、この薬を服用するには不適當な病気（肝臓病など）にかかっていたり、他の薬（心臓病の薬など）を飲んでいたりする場合もあり、危険だからです。


この薬の服用には必ず医師の診断のもとに処方を受けることが必要です。




性行為の約1時間前に服用しましょう。

この薬は、性行為の前に服用する内服薬です。

性行為の約1時間前に、飲んでください。



1時間前



1日1回まで24時間以上あけて服用。

この薬は性的刺激に反応して起こる勃起機能をサポートします。

1日1回までの服用回数を守ってください。つぎに飲むときは、必ず24時間以上（医師に指示された時間があればその時間以上）あけてください。

1回に服用する量は医師の指示に従ってください。処方された量以上を服用しても、効果の増大は望めず、かえって新たな副作用が出現したり、その程度が強くなることがあります。

薬の効き方には個人差があります。効果を得られなかった場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

この薬は催淫剤や性欲増進剤ではありません。

医師の指示により、 5mgを服用する場合

医師の指示により5mgを服用する場合は、10mg錠を半分に割って服用してください。



他の医療機関を受診するときは、 バルデナフィル錠「トーワ」を 服用していることを申し出てください。

他の薬との相互作用や他の病気との影響が出て、危険な場合がありますので、必ずバルデナフィル錠「トーワ」を服用していることを申し出てください。

服用後、性的刺激を受けなかった場合

性的刺激を受けなければ、勃起することはなく、また性的刺激が中止されれば、勃起もおさまります。なお、何か異常がある場合には医師にご相談ください。

性行為感染症を防ぐことはできません。

この薬では、エイズなど性行為によって感染する病気（性行為感染症）を防ぐことはできません。

以下のように保管してください。

光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。

誤って飲んでしまわないよう、こどもの手の届かないところに保管してください。

**ご不明な点は
医師または薬剤師まで
おたずねください。**



主な併用禁忌薬剤名リスト

バルデナフィル錠「トーワ」と一緒に服用してはいけない主な薬です。

【硝酸薬】

- 亜硝酸アミル
- 硝酸イソソルビド
- 一硝酸イソソルビド
- ニコランジル
- ニトログリセリン
- ニトロプルシドナトリウム水和物
- ニプラジロール

【肺高血圧症治療薬】

- リオシグアト

【抗ウイルス薬】

- リトナビル
- アタザナビル硫酸塩
- ホスアンプレナビルカルシウム水和物
- ロピナビル・リトナビル配合製剤
- ダルナビルエタノール付加物を含有する製剤
- コビシスタットを含有する製剤

【抗真菌薬（外用を除く）】

- イトラコナゾール

【抗不整脈薬】

- キニジン硫酸塩
- プロカインアミド塩酸塩
- アミオダロン塩酸塩
- ソタロール塩酸塩

・詳しくは医師・薬剤師にご相談ください。

連絡先(病医院・薬局名)

東和薬品株式会社

2021年2月改訂(C-3)
DC-000508_03