

# プレガバリンOD錠/カプセル「トーワ」を服用されている方とご家族の方へ

## この薬について

- 痛みには、骨折や歯痛などの“炎症の痛み”と坐骨神経痛など“神経の痛み”があります。

この薬は“神経の痛み”に対する薬です。“神経の痛み”は、腰や腕、足などさまざまな場所にあらわれます。

足やお尻にかけて  
広がる痛みや  
しびれるような痛み



腕に広がる痛みや  
しびれるような痛み



足先のピリピリした痛みや  
しびれるような痛み



- この薬は、痛いときにだけ飲むのではなく、一定期間飲み続けることで痛みの軽減が期待できます。
- 飲み始めてから、少しづつ薬の量を増やしていきます。
- 治療には時間がかかることがあります。

薬の量や服用方法等については、自分で判断せず、必ず医師の指示通りに飲んでください。

### OD錠を服用されている方へ

この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。

- 舌の上で唾液を含ませ軽くつぶしてから、唾液と一緒に飲み込んでください。
- 水なしで飲むときは、寝たままで飲まないでください。
- 普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。苦みを感じる場合には、水またはぬるま湯で飲むことをおすすめします。どちらの飲み方でも効き目は変わりません。

## 服用にあたって

- この薬を服用すると、めまいや眠気、意識消失があらわれる可能性があります。
  - ⇒ 特に高齢の方は、転倒の危険がありますので、十分に注意してください。
  - ⇒ 自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。
- この薬を服用中に、体重が増加することがあります。体重が増加し始めた場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 腎臓の悪い方、透析を受けている方、心臓が悪い方、妊娠中または授乳中の方は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- アルコールは薬の作用を強めることがありますので、注意してください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- この薬の服用を急に中止すると、眠れなくなる・吐き気がする・頭痛・下痢などの症状があらわれることがあります。自分の判断で服用を中止したり、服用量や服用回数を変更せず、必ず医師または薬剤師に相談してください。

このほかにも、気になる症状がある場合、わからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。