

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2020年8月

東和薬品株式会社

深在性真菌症治療剤

日本薬局方

フルコナゾール注射液

**フルコナゾール 静注50mg「トーフ」**

**フルコナゾール 静注100mg「トーフ」**

**フルコナゾール 静注200mg「トーフ」**

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせいたします。  
今後のご使用に際しましては、改訂内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容 (\_\_\_\_\_: 追記)

改訂後			改訂前		
3. 相互作用 2) 併用注意 (併用に注意すること)			3. 相互作用 2) 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リトナビル サキナビル オキシコドン	これらの薬剤のAUC上昇の報告がある。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。	リトナビル サキナビル オキシコドン	これらの薬剤のAUC上昇の報告がある。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
<u>トルバプタン</u>	<u>トルバプタンの血中濃度上昇の報告があり、トルバプタンの作用が増強するおそれがある。やむを得ず併用する際は、トルバプタンを減量あるいは低用量から開始すること。</u>				
<u>イブチニブ</u>	<u>イブチニブの副作用が増強されるおそれがある。やむを得ず併用する際は、イブチニブの減量を考慮するとともに、患者の状態を慎重に観察すること。</u>	<u>本剤はイブチニブの主たる代謝酵素であるCYP3Aを阻害するので、併用によりイブチニブの血中濃度が上昇することがある。</u>			

### 2. 改訂理由

「相互作用 併用注意」の項 (自主改訂)

フルコナゾール製剤のCCDS (企業中核データシート) が変更されたため、改訂いたしました。

---

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.292（2020年9月）に掲載の予定です。

最新添付文書は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp>）及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>）に掲載いたします。

---

製造販売元

**東和薬品株式会社**

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

 0120-108-932