

リバスチグミンテープ「トーフ」の使い方

医師の指示に従って正しく使用して下さい。

【注意事項】

- この説明書は大切に保管して下さい。
- 処方された患者さん以外はお使いにならないようお願いします。

リバスチグミンテープ「トーフ」は、有効成分を皮膚から吸収させるようにした薬（テープ）で、もの忘れや判断力の低下などの症状の進行を遅らせる働きがあります。作用は24時間持続します。

薬の使用スケジュール・種類について

- この薬は、1日1回貼りかえて下さい。
- この薬は4種類の大きさがあり、面積が大きくなるほど薬の含有量（4.5mg、9mg、13.5mg、18mg）が多くなっています。


※テープ表面にはボールペンなどで
日付を記入することができます。

※テープ表面にはボールペンなどで 日付を記入することができます。				
実物大・イメージ	4.5mg リバスチグミン (/)	9mg リバスチグミン (/)	13.5mg リバスチグミン (/)	18mg リバスチグミン (/)
薬の含有量	4.5mg	9mg	13.5mg	18mg
テープ包装の色	桃色	黄色	黄緑色	紫色


薬を貼る場所

- 右の図で示した場所のいずれか1カ所に貼って下さい。
- 背中、上腕または胸の正常な皮膚に貼って下さい。
- 傷や皮膚病のある場所はさけて下さい。
- 清潔で乾燥した場所、体毛が少ない場所、密着した衣服を着用してもこすれにくい場所に貼って下さい。
- オイル、ローション、パウダー、クリームが塗られていない場所、テープがしっかり貼れる場所に貼って下さい。

背中



上腕と胸



貼るときの注意


- 前回とは異なる場所（離れた場所）に貼って下さい。
- 一度に2枚以上を貼らないように、まず前回貼ったテープをはがしてから、新しいテープを貼って下さい。
- 薬は、毎日ほぼ同じ時間に貼りかえて下さい。
- この薬は切って使うことはできません。
- 入浴後に貼る場合には、十分に水分を拭き取って乾いてから貼って下さい。

（裏面もお読みください）

この薬の貼り方


※包装に記載のある使用期限内に使用して下さい。

薬を包装から取り出す




内部のテープを傷つけないように、手またはハサミで切り、テープを取り出して下さい。

透明シートをはがす




テープには透明シートがついています。使用時には粘着面に触れないように、はがして下さい。

薬を貼る



粘着面を背中、上腕部、胸のいずれかにあて、透明シートをはがして下さい。


薬を押さえる



テープがしっかりとくっつくまで手のひらで押さえて下さい。

使い終わった薬の捨て方

- テープの端を押さえてゆっくりと優しく皮膚から完全にはがして下さい。
- はがしたテープは、まだ薬の成分が残っているので接着面を内側にして半分に折り込んで下さい。必ず、子どもの手や目の届かないところに廃棄して下さい。
- テープをはがした後は、手を目に触れず、石鹸を使って手を洗って下さい。



保管上の注意

- この薬は1枚ごとに包装されています。包装は貼る直前まで開封しないで下さい。
- この薬は子どもの手や目の届かない場所で保管、管理して下さい。
- 高温にならない場所で保管して下さい。

その他の注意

- 貼り忘れに気付いたときは、その時に貼って下さい。翌日からは、いつもと同じ時間に貼りかえて下さい。貼りかえていないことに気付いた場合でも、一度に2回分を貼らないで下さい。
- 4日間以上貼っていない期間がある場合は、薬の量を減らすことがありますので、薬を貼る前に医師に相談して下さい。
- 貼った薬がはがれたときは、残っている新しい薬を貼り、翌日からはいつもと同じ時間に貼りかえて下さい。はがれた薬は安全に廃棄して下さい。
- この薬を開始した時または増量した時にめまいや眠気がみられることがありますので、自動車の運転など、危険をとまなう機械の操作はしないで下さい。
- 主な副作用として、薬を貼った場所の皮膚症状（赤くなる、かゆみ、など）、嘔吐、悪心などがあらわれることがあります。
- この薬を使用して体調不良などを感じることがあれば、医師や薬剤師に相談して下さい。

使用方法、副作用などの詳しい質問がある場合は、医師や薬剤師にお尋ね下さい。

東和薬品株式会社