

タダラフィルOD錠CI「トーフ」を 適正にご使用いただくために

患者さんとパートナーの方のために

この薬を服用する際には、注意しなければならない
点がありますので、薬を飲む前にこのパンフレットを
必ずお読みください。



タダラフィルOD錠CI「トーフ」を
飲む前に…



あなたにタダラフィルOD錠CI「トーフ」が処方されました。

タダラフィル製剤が原因であることを否定できない死亡例も報告されていますので、このパンフレットを熟読してください。

診察をうける際に、あなたの症状や過去および現在の他の病気・薬剤について、医師によく相談してください。

タダラフィルOD錠CI「トーフ」は、障害されたあなたの勃起機能を改善するための薬ですが、飲み方を誤ると、**重大な副作用があらわれ、命にかかわる**ことがあります。

この冊子には、タダラフィルOD錠CI「トーフ」に関する大切な情報が記載されていますので、この薬をお飲みになる前に、必ずお読みください。さらに、お聞きになりたいことがある場合は、医師または薬剤師におたずねください。

つぎの方は服用しないでください。

この薬は、すべての方に適するわけではありません。硝酸薬（飲み薬・舌下錠・貼り薬・注射・吸入薬・塗り薬・スプレーなど）を使っている方は、決して本剤を服用しないでください。

例えば、狭心症の発作の治療によく処方される**ニトログリセリン**を飲んでいる方、**貼り薬**を貼っている方、**吸入している方などは、過度に血圧が低下することがありますので、絶対に服用しないでください。**

また、他にも飲んでいる薬があれば、必ずそのことを医師または薬剤師にお話してください。

性行為は心臓に負担をかけます。この薬を飲む前に、健康状態について医師とよく話しましょう。とくに心臓に関する持病のある方（狭心症や重度の心血管系障害・心不全など）や脳血管に病気のある方（脳出血、脳梗塞など）は、**死に至ることがありますので、必ず医師にご相談ください。**

もし、服用後に発作が起きたら…。

今まで狭心症と診断されたことがない方でも、性行為中に狭心症の発作を起こす場合があります。本剤を服用後、狭心症が起きた場合の治療法の選択には十分な配慮が必要となります。場合によっては、一般に発作の治療によく用いられている硝酸薬が使用できず、他の薬剤を用いなければならないことがあります。その際には、硝酸薬と同じ効果が得られないことがあります。ことをご承知おきください。

また、発作の治療を受ける際には、発作治療薬の選択のために、必ず本剤を服用した時間を医師にお伝えください。

発作時に自ら医師に伝えられない場合もありますので、パートナーにもあらかじめ本剤を服用していることを伝え、救急医療機関を受診する際には、医師などに「タダラフィルOD錠CI「トーフ」を服用している」ことが必ず伝わるようにしてください。

ご本人、パートナー、家族の方々が、タダラフィルOD錠CI「トーフ」服用の事実を医師に告げられない場合には、狭心症等の治療のために硝酸薬が使用され、過度に血圧が低下することがあります。したがってパートナーの方に必ず本剤を服用していることを伝えてください。

つぎの方は服用しないでください。

今までに、タダラフィル製剤を服用してアレルギー（過敏症）を起こした方

硝酸剤を使用中の方

肺高血圧症の治療に用いられる sGC 刺激剤（リオシグアト）を使用中の方

心血管系障害などのために医師から性行為が不適当だと診断された方

不安定狭心症の方または性交中に狭心症を起こしたことがある方

コントロール不良の不整脈の方、低血圧の方（最高血圧 < 90mmHg または最低血圧 < 50mmHg）やコントロール不良の高血圧の方（最高血圧 > 170mmHg または最低血圧 > 100mmHg）

最近3ヵ月以内に心筋梗塞を起こした方

最近6ヵ月以内に脳梗塞・脳出血を起こした方

重い肝障害のある方

網膜色素変性症（進行性の夜盲）と診断された方

また、赤血球の異常（鎌状赤血球性貧血）、多発性骨髄腫、白血病、血が止まりにくい病気、胃・十二指腸潰瘍、薬物アレルギー、ペニスに関する病気または奇形のある方、他の勃起不全治療薬・勃起補助器具を使用している方や手術を受けた方も、**必ず医師にご相談ください。**


副作用があらわれたときは、 医師または薬剤師にご相談を。

この薬の服用後に急激な視力低下があらわれることがあります。眼の異常に気付かれた場合は服用を中止し、すぐに医師または眼科医を受診してください。

また、この薬によって、「顔が赤くなる(ほてり)」、「消化不良」、「頭痛」、などの副作用があらわれることがあります。

この薬の服用後、めまいや視覚障害(眼のかすみなど)があらわれることがありますので、高所での作業、自動車の運転など危険を伴う機械を操作する場合にはご注意ください。

聴覚に異常を感じた方は、服用を中止し、医師にご相談ください。



こうした症状の他にも、副作用があらわれることがありますので、異常を感じたときには服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。


なお、勃起の持続によってペニスが損傷し勃起機能を永続的に失うことがありますので、タダラフィルOD錠CI「トーフ」服用後4時間以上勃起が続く場合は、すぐに医師に連絡してください。

他の人にあげるのは厳禁です。

この薬は、あなたのために処方された薬です。

パートナーや他の人に絶対あげないでください。その人が性行為をするには不適当な病気（心臓病など）にかかっていたり、この薬を服用するには不適当な病気（肝臓病など）にかかっていたり、他の薬（心臓病の薬など）を飲んでいたりする場合もあり、危険だからです。

この薬の服用には必ず医師の診断のもとに処方を受ける必要があります。



性行為の約1時間前に服用しましょう。

この薬は、性行為の前に服用する内服薬です。

性行為の約1時間前に、飲んでください。

**タダラフィルOD錠CI「トーフ」は
水なしでも飲むことができます。**

この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠（OD錠）です。

舌の上で唾液を含ませ軽くつぶしてから、唾液と一緒に飲み込んでください。

水なしで飲むときは、寝たままで飲まないでください。

普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。どちらの飲み方でも効き目は変わりません。

1日1回まで24時間以上あけて服用。

この薬は性的刺激に反応して起こる勃起機能をサポートします。

1日1回までの服用回数を守ってください。つぎに飲むときは、必ず24時間以上（医師に指示された時間があればその時間以上）あけてください。

1回に服用する量は医師の指示に従ってください。処方された量以上を服用しても、効果の増大は望めず、かえって新たな副作用が出現したり、その程度が強くなることがあります。

薬の効き方には個人差があります。効果を得られなかった場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

この薬は催淫剤や性欲増進剤ではありません。

医師の指示により、 5mgを服用する場合

医師の指示により5mgを服用する場合は、10mg錠を乾いた手で半分に割って服用してください。



**他の医療機関を受診するときは、
タダラフィルOD錠CI「トーフ」を
服用していることを申し出てください。**

他の薬（特に心臓病）との相互作用や他の病気との影響が出て、危険な場合がありますので、**必ずタダラフィルOD錠CI「トーフ」を服用していることを申し出てください。**

服用後、性的刺激を受けなかった場合

性的刺激を受けなければ、勃起することはなく、また性的刺激が中止されれば、勃起もおさまります。なお、何か異常がある場合には医師にご相談ください。

性行為感染症を防ぐことはできません。

この薬では、エイズなど性行為によって感染する病気（性行為感染症）を防ぐことはできません。

以下のように保管してください。

光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。

誤って飲んでしまわないよう、こどもの手の届かないところに保管してください。

ご不明な点は
医師または薬剤師に
おたずねください。



主な併用禁忌薬剤名リスト

タダラフィルOD錠CI「トーフ」と一緒に使用してはいけない主な薬です。

【硝酸薬】

●亜硝酸アミル

- ・亜硝酸アミル「AFP」

●硝酸イソソルビド

- ・硝酸イソソルビド徐放錠 / 徐放カプセル / テープ / 注射液
- ・ニトロール錠 / Rカプセル / 注 / スプレー
- ・フランドル錠 / テープ

●一硝酸イソソルビド

- ・一硝酸イソソルビド錠
- ・アイトロール錠

●ニコランジル

- ・ニコランジル錠 / 注射用
- ・シグマート錠 / 注

●ニトログリセリン

- ・ニトログリセリンテープ / 注射液 / シリンジ製剤
- ・ニトロダーム TTS ・ニトロペン舌下錠
- ・バソレーターテープ / 注 ・ミオコールスプレー
- ・ミニトロテープ ・ミリステープ
- ・ミリスロール注 ・メディトランステープ

●ニトロプルシドナトリウム水和物

- ・ニトロプルシド持続静注液

●ニブラジロール

- ・ハイパジールコーワ錠

【肺高血圧症治療薬】

●リオシグアト

- ・アデムパス錠

・詳しくは医師または薬剤師にご相談ください。

施設名

東和薬品株式会社

2020年8月作成 (C-2)
DC-000617_02