


# フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 $\mu$ g「トーフ」 の使用方法


お薬を正しく使用していただくため以下の事項をお守りください。

- この使用説明書をよく読んで使用してください。
- 医師に指示された用法・用量（噴霧回数）を守ってください。
- このお薬は、すぐに鼻の症状を改善するお薬ではありません。通常、症状が改善されるまでには数日かかります。毎日継続して使用することで効果を得ることができます。
- 容器（噴霧器）の先端の噴霧口を針やピンなどで突かないでください。（先端の穴が壊れ、噴霧できなくなります。）




## 初回のご使用にあたって

新しい容器（噴霧器）を使用するときは、キャップをはずし、右図のように5回押し、お薬が霧状に噴霧されるか確認してください。この操作は2回目の使用からは不要です。



### 1 鼻をかむ




鼻をかんで、鼻のとおりを良くしてください。

### 2 容器を振る




キャップをはずし、上図のように矢印の方向によく振ってください。

### 3 噴霧する




少しうつむいた姿勢で容器をまっすぐに持ち、鼻の穴に容器の先端を入れ、**容器の底を止まるところまで押し**て噴霧してください。もう片方の鼻の穴にも同じ方法で噴霧してください。

### 4 浸透させる



噴霧したら、鼻の奥までお薬を行き渡らせるために、数秒間、顔を軽く上に向けて鼻で静かに呼吸してください。**このとき、鼻をかまないでください。**

### 5 お手入れ



容器の先端をティッシュペーパーなどできれいに拭いたあと、キャップをつけ、専用の携帯袋に入れ、室温で保管してください。

このお薬、または噴霧方法についてご質問がありましたら、医師、または薬剤師にお問い合わせください。

使用開始日                      年      月      日

## 噴霧回数チェック表について

- このお薬は、すぐに鼻の症状を改善するお薬ではありません。通常、症状が改善されるまでには数日かかります。毎日継続して使用することで効果を得ることができます。忘れず継続して使用するために、右のチェック表を活用ください。
- 医師に指示された用法・用量（噴霧回数）を守ってください。
- このお薬は、28回噴霧用は1本で28回、56回噴霧用は1本で56回の定量噴霧ができるように設計されています。

使用方法については裏面をご覧ください。

## 噴霧回数チェック表

噴霧するごとに、記入欄を ☒ チェックしてください。

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目

[illegible]

8日目 9日目 10日目 11日目 12日目 13日目 14日目

[illegible]