

ソリフェナシンコハク酸塩OD錠/錠「トロー」を 服用される方へ

この薬について

- この薬は過活動膀胱における症状（がまんできない強い尿意、トイレが近い、トイレに間に合わず尿がもれる）を改善する薬です。
- 1日1回服用します。1回に服用する量は人によって異なります。必ず、医師または薬剤師の指示に従ってください。
- かみ砕かず、そのまま飲んでください。
- 医師または薬剤師の指示なしに自分の判断で飲むのをやめたりしないでください。毎日飲み続けることが大切です。

服用にあたっての注意事項

この薬を飲むと、次のような症状があらわれることがあります。
気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

- 口内乾燥（口が渇く）
- 便秘
- 排尿困難（尿が出にくい）、尿閉（尿が出なくなる）
- 目のかすみ、めまい

目のかすみ、めまいなどがあらわれることがあるので、
高い所での作業や自動車の運転など危険を伴う作業をする際は十分に注意してください。

OD錠を服用される方へ

- この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠（OD錠）です。
- 舌の上で唾液を含ませ軽くつぶしてから、唾液と一緒に飲み込んでください。
 - 水なしで飲むときは、寝たままでは飲まないでください。
 - 普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。どちらの飲み方でも効き目は変わりません。

東和薬品株式会社