

オロパタジン点眼液0.1%「トーフ」を 使用される方へ

この点眼液は、アレルギー性結膜炎を
治療する薬です。

液の色は無色から微黄色澄明です。

点眼の方法

1 点眼前に手をよく洗ってください。

2 下まぶたを下げて、容器の先が
目やまつ毛などに触れないよう、
ゆっくり1滴点眼してください。

3 点眼液が目のまわりについたときは、
清潔なガーゼやティッシュなどで
ふき取ってください。

4 点眼後はまぶたを閉じ、
目がしらの下(目と鼻の間あたり)を、
1～5分程度指で
軽く押さえてください。
(点眼液が鼻などに流れ込むのを防ぎます。)



(裏面もお読みください)

ご使用にあたり、次の点にご注意ください

- 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- 他の点眼液も使用している場合には、間隔を5分以上あけて点眼してください。
- コンタクトレンズをしている方は、コンタクトレンズを外してから点眼してください。また、点眼後は10分以上経過してからコンタクトレンズを装用してください。
- 保存の際は、光に当たらないよう、添付の遮光袋に入れてください。
- 開封後は4週間以内に使用し、残液は使用しないでください。
- 中身を他の容器などに入れ替えることは、薬剤の品質が変化するおそれがあるため、おやめください。
- 目が痛い、目やまぶたが赤くなる、目やまぶたの周りが腫れる、目やまぶたがかゆい、頭痛がするなどの症状があらわれた場合、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- その他、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

東和薬品株式会社

2021年8月作成 (DC-001030)