



2021年8月作成
DC-001162

PEM+CBDCA
NSCLC

ペメトレキセド+カルボプラチン併用療法を 受けられる患者さんとお家族の方へ

非小細胞肺癌 (NSCLC※)

非小細胞肺癌について	3
非小細胞肺癌の化学療法について	4
ペメトレキセドはどのような薬？	6
ペメトレキセド点滴日のスケジュール	8
葉酸、ビタミンB ₁₂ は治療に必要不可欠	10
治療全体のスケジュール	12
ペメトレキセドの治療を受ける前のチェック事項	14
点滴中の注意事項	15
副作用について	16
治療日誌	24

※NSCLC・・・non-small cell lung cancer

非小細胞肺癌について


肺癌は、肺や気管支の細胞ががん化したものです。

この肺癌は、がん細胞の形などから、いくつかの種類に分類されます。
これを「組織型分類」と呼びます。

肺癌は、まず「小細胞肺癌」と「非小細胞肺癌」の2つに大きく分類され、非小細胞肺癌はさらに「非扁平上皮がん」と「扁平上皮がん」に、非扁平上皮がんはさらに「大細胞がん」と「腺がん」に分類されます。

ペメトレキセドは、これらの組織型のうち『非扁平上皮がん』に有効性が認められています。

肺癌の主な組織型による分類



非小細胞肺がんの化学療法について

化学療法は、抗がん剤（抗悪性腫瘍薬）を使用して、がん細胞を死滅させることで、がんの進行やがんの症状を抑える治療法です。

抗がん剤は、血液によって全身に行き渡るため、手術や放射線では治療できない場合などでも、がん細胞を攻撃することができます。

非小細胞肺がんの化学療法では大きく分けて、以下の種類の薬が使用されます。どの薬を使用するかは、がんの組織型分類や体の状態などによって異なります。また、1種類の薬で治療する場合や、いくつかの薬を組み合わせで治療をする「併用化学療法」を用いる場合があります。

非小細胞肺がんの化学療法に用いられる薬の種類



分子標的薬

がん細胞が持つ増殖などに関わる特徴的な分子（ドライバー遺伝子）などを目印にして、がんを攻撃する薬です。

免疫チェックポイント阻害剤

免疫のはたらきを抑えようとするがん細胞の機能を抑えて、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ薬です。免疫に関わる「PD-L1」というタンパク質をがん細胞が持っているかを調べて選択されます。

細胞障害性抗がん剤

細胞が増殖する仕組みの一部を障害することで、がん細胞を攻撃する薬です。


ペメトレキセドは、この種類に分類されます。

化学療法の方針を決める際に、がん細胞の遺伝子を調べることで、がんのタイプにあわせた治療を行うことができます。

分子標的薬ではがん細胞のドライバー遺伝子の異常、免疫チェックポイント阻害剤ではがん細胞にPD-L1がどのぐらいの割合で発現しているかを調べて、その結果から使用する薬を選択して治療を行います。

用いられる治療薬やその組み合わせは、患者さんの全身状態や年齢などを考慮して選択されます。

(Ⅳ期)化学療法の治療方針




ペメトレキセドはどのような薬？

ペメトレキセドは、「細胞障害性抗がん剤」の1つです。細胞障害性抗がん剤は、薬の働きによりさらにいくつかの種類に分類され、ペメトレキセドは「葉酸代謝拮抗薬」に分類されます。

がん細胞を含むすべての細胞には、生命を維持するために必要な情報が刻まれている「DNA」があります。細胞は、増殖する際に新しくDNAを合成し、その時にビタミンの1種「葉酸」が必要となります。

がん細胞は、増殖する際に葉酸を必要とする


肺がんのがん細胞は、「葉酸」を取り込むことでDNAを合成して増殖します。



ペメトレキセドは葉酸に似た薬で、がん細胞は葉酸と間違っペメトレキセドを取り込みます。ペメトレキセドを取り込んだがん細胞は、DNAを合成できなくなり、増殖せずに死滅します。

ペメトレキセドを投与すると、がん細胞は、葉酸と間違っペメトレキセドを取り込む

がん細胞は葉酸に似たペメトレキセドを間違っ取り込みます。すると、がん細胞はDNAを合成できなくなり、増殖せずに死滅します。



ペメトレキセド点滴日のスケジュール

ペメトレキセドは、点滴で10分間かけて投与する抗がん剤です。

カルボプラチンは30分以上かけて点滴し、全体の点滴時間は1～2時間となります。

点滴は、入院しないで外来でも受けることができますので、詳しくは医療スタッフにお尋ねください。

点滴スケジュール例



制吐剤
ステロイド

ペメトレキセド
点滴
10分

カルボプラチン
点滴
30分以上

点滴は3週間ごとに繰り返します。

ペメトレキセドの点滴を受けた後は、少なくとも20日間は点滴をせずにお休みします（休薬期間）。

点滴日と休薬期間20日間を合わせた21日間（3週間）を1コースとして、治療を繰り返します。なお、患者さんの状態によっては、休薬期間を延長することがあります。

治療スケジュールのイメージ



12ページに、詳しい治療スケジュールを掲載しています。

葉酸、ビタミンB₁₂は治療に必要不可欠

ペメトレキシドの治療では、葉酸とビタミンB₁₂を補給することで副作用を軽減できることが分かっています。

そのため、ペメトレキシドの治療には、葉酸とビタミンB₁₂は必要不可欠です。

一方で、大量に葉酸を摂取するとペメトレキシドの効果を弱めてしまうおそれがありますので、医療スタッフの指示に従ってください。



葉酸の服用方法

ペメトレキシドの最初の点滴日の7日以上前から、葉酸を1日1回毎日服用します。

ペメトレキシドの治療を終了した場合は、最後の点滴日から22日目まで可能な限り葉酸を服用します。

ペメトレキシド初回投与
の7日以上前

ペメトレキシド最終投与日から22日目まで投与

葉酸

1日1回

ビタミンB₁₂の投与間隔

ペメトレキシドの最初の点滴日の少なくとも7日前にビタミンB₁₂を筋肉内注射し、その後は9週間に1回注射します。

ペメトレキシドの治療を終了した場合は、最後の点滴日から22日目までは9週間に1回注射のスケジュールを継続します。

ペメトレキシド初回投与
の少なくとも7日前

ペメトレキシド最終投与日から22日目まで投与

ビタミン
B₁₂

9週間に1回


9週間に1回

自己判断でサプリメントなどを用いて葉酸を摂取しないようにしてください。治療に影響する可能性があります。

治療全体のスケジュール

ペメトレキセド+カルボプラチン併用療法の治療全体のスケジュールは下記の通りです。患者さんによっては、免疫チェックポイント阻害剤を併用することがあります。

4コース治療を行った後、がんの進行を予防するために維持療法を行います。維持療法では、ペメトレキセドのみを投与します。免疫チェックポイント阻害剤を併用していた患者さんでは、免疫チェックポイント阻害剤も継続します。



薬の種類、体調や副作用等によってスケジュールが変更になる場合があります。

*効果や副作用などを総合に判断して維持療法を行うかを判断します。

ペメトレキシドの治療を受ける前の チェック事項

ペメトレキシドの治療を受ける前に、下記の項目を確認してください。
該当する項目がある場合は、治療を受ける前に必ず医療スタッフに伝えてください。

	体調・条件	チェック
1	これまでに薬の服用や注射で発疹や過敏症がでたことがある	
2	血液検査で、赤血球、白血球、血小板のいずれかの数値が低いと指摘されている	
3	肺の病気（間質性肺炎、肺線維症）がある、または過去にあった	
4	胸やお腹に水が溜まっていると言われている	
5	腎臓に異常がある	
6	肝臓に異常がある	
7	妊娠している、妊娠している可能性がある	
8	授乳中	

下記についても該当する場合は、医療スタッフに伝えてください。

1	ほかにお薬（ドラッグストアや薬局で購入したお薬を含む）を服用している	
2	サプリメントや健康食品を服用している	

点滴中の注意事項

ペメトレキシドの点滴を安全に行うために、点滴中は体を大きく動かさず
安静にし、下記の事に注意してください。

下記のような症状がみられましたら、**すぐに医療スタッフを呼んでください。**

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ☐ 皮膚のかゆみ | ☐ のどのかゆみ |
| ☐ 蕁麻疹 | ☐ 息苦しさ |
| ☐ 声のかすれ | ☐ 動悸 |
| ☐ くしゃみ | ☐ 意識の混濁 |

点滴の針を刺している部位に下記のような症状がみられましたら、**すぐに医療スタッフを呼んでください。**

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ☐ 痛み | ☐ 皮膚が赤い |
| ☐ 腫れ | ☐ 違和感 |


吐き気を感じましたら、我慢せずに医療スタッフを呼んでください。

副作用について

抗がん剤は、がん細胞だけでなく、正常な細胞にも影響してしまうため、何らかの副作用があらわれることがあります。どのような副作用がいつ頃起こりやすいかは、ある程度分かっています。

事前に起こりやすい副作用を確認し、適切な対策を行うことで、症状を和らげ、より良い治療を続けることができます。

次のページからは、主な副作用とその対策、医療スタッフに連絡するタイミングを記載していますので、確認してください。



ペメトレキセドで特に注意が必要な副作用



下記の副作用が疑われる症状がみられましたら、速やかに医療機関に連絡してください。

副作用名	主な症状
骨髄抑制	からだがだるい、発熱、鼻血、歯ぐきの出血、息切れ、あおあざができる、出血が止まりにくい、出血しやすい
感染症	かぜのような症状、からだがだるい、発熱、嘔吐（おうと）
間質性肺炎	痰の出ない咳（から咳）、息苦しい、息切れ、発熱
ショック アナフィラキシー	呼吸困難、息がヒューヒューする（喘鳴）、血圧低下、発疹、発赤、かゆみ
重度の下痢	何度も水のような便が出る、下腹部の痛み、体がだるい、発熱
脱水	のどが渇く、強い倦怠感、脱力感、尿の量が減る、皮膚の乾燥、脈が速くなる、血圧低下
腎不全	のどが渇く、尿の量が減る、体や足がむくむ、目のはれ、だるい、疲れやすい
中毒性表皮壊死融解症（TEN） 皮膚粘膜眼症候群 （Stevens-johnson症候群）	発熱、高熱、中央にむくみを伴った赤い斑点、赤い発疹、まぶたや眼の充血、結膜のただれ、ひどい口内炎、唇や口内のただれ、陰部の痛み、からだがだるい、食欲不振

副作用について

吐き気/嘔吐/食欲不振

起こりやすい時期

点滴当日から数日間、起こることがあります。

症 状

- ・吐き気がする
- ・嘔吐する
- ・食欲がない



- ◆食べられる時に少量ずつ食べましょう。
- ◆消化の悪いものは避けましょう。

❗ 次のような症状があらわれたら医療スタッフに相談してください

- 食事や水分をほとんど摂ることができない。

口内炎

起こりやすい時期

点滴後数日～数週間で、起こることがあります。

症 状

- 口の中が
- ・腫れる
 - ・ただれる
 - ・痛む



- ◆口の中を清潔に保ち、うるおった状態を保ちましょう。

❗ 次のような症状があらわれたら医療スタッフに相談してください

- 強い痛みがある。
- 痛みで食事や水分摂取することが難しい。

下痢

起こりやすい時期

点滴後数日～数週間で、起こることがあります。

症 状

- ・軟便・水様便になる
- ・排便の回数が増える
- ・腹痛



- ◆腹部を温めて安静にしましょう。
- ◆消化の良いものを食べましょう。
- ◆脱水症状にならないように、こまめに水分を摂りましょう。

❗ 次のような症状があらわれたら医療スタッフに相談してください

- 治療前に比べて1日7回以上、排便が増えている。

疲労感

起こりやすい時期

点滴後数日で、起こることがあります。

症 状

- ・常に疲れる
- ・だるい
- ・体が重い
- ・何もする気が起きない



- ◆睡眠や休息を十分にとりましょう。
- ◆できる範囲で、軽く体を動かしましょう。

❗ 次のような症状があらわれたら医療スタッフに相談してください

- 休息しても改善せず、身の回りのこと(食事、着替え、トイレ、入浴など)を行うのもつらい。

副作用について

感染症 (好中球減少)

起こりやすい時期

点滴後数日～数週間で、起こることがあります。

症 状

- ・発熱
- ・寒気
- ・咳
- ・のどの腫れ・痛み



◆手洗い・うがい・マスクなどの風邪対策をしましょう。

❗ 次のような症状があらわれたら医療スタッフに相談してください

- 37.5℃を超える発熱がある。

貧血 (赤血球減少)

起こりやすい時期

点滴後数週間～数ヵ月で、起こることがあります。

症 状

- ・白目、唇が青くなる
- ・めまい
- ・動悸
- ・息切れ



◆睡眠や休息を十分にとりましょう。

❗ 次のような症状があらわれたら医療スタッフに相談してください

- 動悸、息切れ、頭痛、めまい、耳鳴りなどの症状がある。

呼吸困難 (間質性肺炎)

起こりやすい時期

治療中は、いつでも起こる可能性があります。

症 状

- ・息切れ
- ・痰の出ない咳 (から咳)



❗ 次のような症状があらわれたら医療スタッフに相談してください

- 軽い動作でも息切れがする
- 痰の出ない咳 (から咳) が続く

発疹

起こりやすい時期

点滴後数日～数週間で、起こることがあります。

症 状

- ・主に体幹部に発疹
- ・色素沈着



◆症状がある場合は、医療スタッフに相談してください。

◆症状によっては副腎皮質ホルモン剤 (ステロイド剤) を用いて治療します。

❗ 次のような症状があらわれたら医療スタッフに相談してください

- お薬を使用しても改善する傾向がみられない。

副作用について

脱毛

起こりやすい時期

点滴後数週間で、起こることがあります。

症 状

- ・ 髪の毛が抜ける
- ・ 体毛が抜ける



- ◆ 治療開始前に髪の毛を短くしておくと、脱毛時の手入れがしやすいです。
- ◆ 毛髪や頭皮に負担をかけないようにしましょう。
 - ・ 毛先の柔らかいヘアブラシを使用する。
 - ・ ドライヤーの温度を低めにする。
 - ・ パーマ、毛染めは避ける。
 - ・ シャンプーは手に取り、泡立ててから優しく洗髪する。

手足のしびれ・痛み (末梢神経障害)

起こりやすい時期

点滴後数週間～数ヵ月で、起こることがあります。

症 状

- ・ 手足のしびれ
- ・ 手足に刺すような痛み
- ・ 手足の感覚がおかしい



！ 次のような症状があらわれたら医療スタッフに相談してください

- 手足のしびれなど上記の症状がある。

免疫チェックポイント阻害剤
を投与する場合

特徴的な副作用

起こりやすい時期

治療中は、いつでも起こる可能性があります。

！ 次のような症状があらわれたら医療スタッフに相談してください

- 間質性肺炎：息切れ、痰の出ない咳（から咳）、発熱
- 1型糖尿病：喉が渇く、水分を多く摂取、尿量の増加、頻尿
- 腸炎：頻回の下痢、血便、ねばりけのある便
- 重症筋無力症：まぶたが下がる、力が入らない、ろれつが回らない
- 筋炎・横紋筋融解症：力が入らない、筋肉のこわばり、赤褐色の尿
- 神経障害：手足に力が入らない、しびれ、物が二重に見える
- 重度の皮膚障害：水ぶくれ、重度の口内炎、眼粘膜のただれ
- 内分泌障害：体重減少・増加、疲労感、食欲低下など
- 腎機能障害：むくみ、血尿、尿量の減少、体重増加
- 肝機能障害：疲れやすい、だるい、発熱、白眼や皮膚が黄色くなる
- 脾炎：腹痛、背中痛み、疲れやすい、だるい
- 心筋炎：胸の痛み、発熱、息切れ
- 脳炎・脊髄炎：頭痛、嘔吐、意識障害、けいれん、首が前に曲げられない
- 重度の血液障害：内出血、出血が止まりにくい、貧血、感染症
- 結核：咳、血痰、発熱、体重減少、寝汗
- インフュージョンリアクション：皮膚のかゆみ、じんま疹、声がかすれる、くしゃみが出る、喉のかゆみ、息苦しい、胸がドキドキする、意識がうすれる、めまい、ふらつき、血圧の低下
- ぶどう膜炎：視力の異常

治療日誌

患者さんの体調や治療の情報を、治療に関わる医療施設や調剤薬局などが共有して適切な対応を行うことが、より良い治療を進める上で大切です。この治療日誌では、患者さんの体調やお薬の服薬状況などを記入することができます。受診時やお薬を受け取るときに、この冊子を見せるようにしましょう。



記入例

1コース目のみ、治療開始前の葉酸の服用、ビタミンB₁₂の注射を確認して、チェックしてください。

投与した日に✓をつけてください。

症状がある場合は✓をつけてください。

食事の量と便の状態は下記を目安に記入してください。

食事の量

◎：全部食べられた
○：半分以上
△：半分以下
×：食べられなかった

便の状態

○：普通
△：硬い
×：やわらかい
××：下痢

気になることなどをご自由に記入してください。

		治療開始前	10/30	10/31	11/1	11/2
日付						
お薬	葉酸	☑※3	☑	☑	☑	☑
	ビタミンB ₁₂	☑※4				
	ペメトレキセド		☑			
	カルボプラチン		☑			
その他						
体温			36.2℃	36.3℃	36.3℃	36.1℃
消化器症状	食事の量※1		◎	◎	◎	◎
	口内炎					
	吐き気・嘔吐			✓		
	排便回数		1	1	1	2
	便の状態※2		○	○	○	○
疲労感						
発疹						
脱毛						
咳・息苦しさ						
手足のしびれ・痛み						
その他						
メモ (気になること、 医師に伝えたいことなど)						

			コース目																												
日付		治療 開始前	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
お薬	葉酸	☐ ※3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	ビタミンB12	☐ ※4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	ペメトレキセド	☐																													
	カルボプラチン	☐																													
その他																															
体温			℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
消化器 症状	食事の量 ※1																														
	口内炎																														
	吐き気・嘔吐																														
	排便回数																														
	便の状態 ※2																														
疲労感																															
発疹																															
脱毛																															
咳・息苦しさ																															
手足のしびれ・痛み																															
その他																															
メモ (気になること、 医師に伝えたいことなど)																															

※1 食事の量：◎全部食べられた、○半分以上、△半分以下、×食べられなかった

※2 便の状態：○普通、△硬い、×やわらかい、××下痢

※3 治療開始前の葉酸：ペメトレキセドの最初の点滴日の7日以上前から1日1回毎日服用する。

※4 治療開始前のビタミンB12：ペメトレキセドの最初の点滴日の7日以上前に筋肉内注射する。

		コース目																							
日付		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
お薬	葉酸	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ビタミンB12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ペメトレキセド	☐																							
	カルボプラチン	☐																							
その他																									
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
消化器症状	食事の量 ※1																								
	口内炎																								
	吐き気・嘔吐																								
	排便回数																								
	便の状態 ※2																								
疲労感																									
発疹																									
脱毛																									
咳・息苦しさ																									
手足のしびれ・痛み																									
その他																									
メモ (気になること、 医師に伝えたいことなど)																									

※1 食事の量：◎全部食べられた、○半分以上、△半分以下、×食べられなかった
※2 便の状態：○普通、△硬い、×やわらかい、××下痢

		コース目																							
日付		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
お薬	葉酸	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ビタミンB12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ペメトレキセド	☐																							
	カルボプラチン	☐																							
その他																									
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
消化器症状	食事の量 ※1																								
	口内炎																								
	吐き気・嘔吐																								
	排便回数																								
	便の状態 ※2																								
疲労感																									
発疹																									
脱毛																									
咳・息苦しさ																									
手足のしびれ・痛み																									
その他																									
メモ (気になること、 医師に伝えたいことなど)																									

※1 食事の量：◎全部食べられた、○半分以上、△半分以下、×食べられなかった
※2 便の状態：○普通、△硬い、×やわらかい、××下痢

		コース目																							
日付		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
お薬	葉酸	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ビタミンB12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ペメトレキセド	☐																							
	カルボプラチン	☐																							
その他																									
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
消化器症状	食事の量 ※1																								
	口内炎																								
	吐き気・嘔吐																								
	排便回数																								
	便の状態 ※2																								
疲労感																									
発疹																									
脱毛																									
咳・息苦しさ																									
手足のしびれ・痛み																									
その他																									
メモ (気になること、 医師に伝えたいことなど)																									

※1 食事の量：◎全部食べられた、○半分以上、△半分以下、×食べられなかった
※2 便の状態：○普通、△硬い、×やわらかい、××下痢

		コース目																							
日付		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
お薬	葉酸	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ビタミンB12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ペメトレキセド	☐																							
	カルボプラチン	☐																							
その他																									
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
消化器症状	食事の量 ※1																								
	口内炎																								
	吐き気・嘔吐																								
	排便回数																								
	便の状態 ※2																								
疲労感																									
発疹																									
脱毛																									
咳・息苦しさ																									
手足のしびれ・痛み																									
その他																									
メモ (気になること、 医師に伝えたいことなど)																									

※1 食事の量：◎全部食べられた、○半分以上、△半分以下、×食べられなかった
※2 便の状態：○普通、△硬い、×やわらかい、××下痢

		コース目																							
日付		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
お薬	葉酸	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ビタミンB12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ペメトレキセド	☐																							
	カルボプラチン	☐																							
その他																									
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
消化器症状	食事の量 ※1																								
	口内炎																								
	吐き気・嘔吐																								
	排便回数																								
	便の状態 ※2																								
疲労感																									
発疹																									
脱毛																									
咳・息苦しさ																									
手足のしびれ・痛み																									
その他																									
メモ (気になること、 医師に伝えたいことなど)																									

※1 食事の量：◎全部食べられた、○半分以上、△半分以下、×食べられなかった
※2 便の状態：○普通、△硬い、×やわらかい、××下痢

		コース目																							
日付		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
お薬	葉酸	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ビタミンB12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ペメトレキセド	☐																							
	カルボプラチン	☐																							
その他																									
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
消化器症状	食事の量 ※1																								
	口内炎																								
	吐き気・嘔吐																								
	排便回数																								
	便の状態 ※2																								
疲労感																									
発疹																									
脱毛																									
咳・息苦しさ																									
手足のしびれ・痛み																									
その他																									
メモ (気になること、 医師に伝えたいことなど)																									

※1 食事の量：◎全部食べられた、○半分以上、△半分以下、×食べられなかった
※2 便の状態：○普通、△硬い、×やわらかい、××下痢

		コース目																							
日付		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
お薬	葉酸	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ビタミンB12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ペメトレキセド	☐																							
	カルボプラチン	☐																							
その他																									
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
消化器症状	食事の量 ※1																								
	口内炎																								
	吐き気・嘔吐																								
	排便回数																								
	便の状態 ※2																								
疲労感																									
発疹																									
脱毛																									
咳・息苦しさ																									
手足のしびれ・痛み																									
その他																									
メモ (気になること、 医師に伝えたいことなど)																									

※1 食事の量：◎全部食べられた、○半分以上、△半分以下、×食べられなかった
※2 便の状態：○普通、△硬い、×やわらかい、××下痢

memo

緊急の連絡先

病院・医院名

電話番号

担当医師名

科

お問い合わせ窓口

memo

発行：2021年

監修：愛知県がんセンター 呼吸器内科 部長
藤原 豊 先生

愛知県がんセンター 薬剤部 専門員
前田 章光 先生

提 供：東和薬品株式会社

本冊子の内容を許可なしに複製、複写(コピーなど)、転載することは法律で認められた場合を除き禁じられています。