

使用上の注意改訂のお知らせ

2021 年 12 月

東和薬品株式会社

抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤

日本薬局方

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、改訂内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（_____：追記、_____：削除）

改 訂 後			改 訂 前		
【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 2) 本剤投与中はカルバペネム系抗生物質（パニペネム・ベタミプロン、メロペネム水和物、イミペネム水和物・シラスタチン、 <u>レレバクタム水和物・イミペネム水和物・シラスタチン</u> 、 <u>ビアペネム、ドリペネム水和物、テビペネム ピボキシル</u> ）を併用しないこと。（「相互作用」の項参照）			【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 2) 本剤投与中はカルバペネム系抗生物質（パニペネム・ベタミプロン、メロペネム水和物、イミペネム水和物・シラスタチン <u>ナトリウム</u> 、ビアペネム、ドリペネム水和物、テビペネム ピボキシル）を併用しないこと。（「相互作用」の項参照）		
3. 相互作用 1) 併用禁忌（併用しないこと）			3. 相互作用 1) 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カルバペネム系抗生物質 パニペネム・ベタミプロン カルベニン メロペネム水和物 メロペン イミペネム水和物・シラスタチン チエナム <u>レレバクタム水和物・イミペネム水和物・シラスタチン</u> <u>レカルブリオ</u> ビアペネム オメガシン ドリペネム水和物 フィニバックス テビペネム ピボキシル オラペネム	てんかんの発作が再発することがある。	バルプロ酸の血中濃度が低下する。	カルバペネム系抗生物質 パニペネム・ベタミプロン カルベニン メロペネム水和物 メロペン イミペネム水和物・シラスタチン <u>ナトリウム</u> チエナム ビアペネム オメガシン ドリペネム水和物 フィニバックス テビペネム ピボキシル オラペネム	てんかんの発作が再発することがある。	バルプロ酸の血中濃度が低下する。

2. 改訂理由

「禁忌」「相互作用 併用禁忌」の項（自主改訂）

相互作用の相手薬剤と整合性をとるため、改訂いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.305（2022年1月）に掲載の予定です。

最新添付文書は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp>）及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>）に掲載いたします。

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

 0120-108-932