

オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「トローワ」を 服用される方へ



この薬は脂質異常症（高脂血症）の薬です。
この薬の主成分は、青魚に多く含まれるEPA・
DHAなどのオメガ-3脂肪酸であり、中性脂肪を
低下させます。

- 中性脂肪は、体の機能を保つためのエネルギーとして使われます。血液中の中性脂肪は、通常は一定の割合で保たれていますが、その量が基準値よりも高くなると脂質異常症と診断されます。

脂質異常症を治療せずに放置すると動脈硬化を進めてしまい、心筋梗塞や脳梗塞になる危険性が高くなります。

- 脂質異常症の治療では、食事療法・運動療法を中心とした生活習慣の改善が基本です。薬物療法を開始した後も、生活習慣の改善を継続することが重要です。主治医と相談しながらしっかりと治療を行っていきましょう。

[脂質異常症—治療・セルフケアのポイント—](#)については、
こちらもご参考ください



（裏面もお読みください）

服用方法

- 袋を立てて、服用直前に開封してください。
- **食後すぐに、かまずに**のんでください。空腹時にのむと、薬の主成分(オメガ-3脂肪酸)が吸収されにくくなります。
- 必ず1回に1包を服用してください。
- ひと口で服用しにくい場合は、黄色の  部分を抑えて分けて服用してください。
- 粒状カプセルが詰まった場合は、切り取り線で切り取り、残りを取り出してください。



スティックに粒状のカプセルが入っています。

デザインは変更になることがあります。

- 医師または薬剤師の指示どおりに服用してください。
- その他お困りのことがあれば、医師または薬剤師に相談してください。

東和薬品株式会社