

痛風・高尿酸血症で フェブキソスタット錠「トーワ」を 服用される方へ

この薬は、効能又は効果に応じて、
用法及び用量が異なります。

本指導箋は、「痛風・高尿酸血症」の
治療を目的にフェブキソスタット錠
「トーワ」を処方された患者さん
にお渡しください。

東和薬品株式会社

痛風・高尿酸血症で フェブキソスタット錠「トローワ」を 服用される方へ

この薬は、
血液中の尿酸の濃度(尿酸値)を下げる薬です。
痛風や高尿酸血症の治療に用いられます。

**この薬の飲み始めに、
痛風発作が起こることがありますが、
そのままお薬を飲み続けてください。**

血液中の尿酸の濃度が急激に下がることにより、
痛風発作が起こることがあります。

痛風発作が起きた時の治療については、あらか
じめ医師や薬剤師に確認しておきましょう。

[痛風・高尿酸血症—予防・治療・セルフケアのポイント—](#)
については、こちらもご参考ください。



(裏面もお読みください)

服用中に気をつけること

●薬を飲み忘れた場合の対処

飲み忘れに気づいたら、できるだけ早く1回分を飲んでください。次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。

●自己判断で薬を止めないようにしましょう

この薬は尿酸値をゆっくり下げするために、少ない量から開始し目標の尿酸値に下がるまで段階的に量を増やしていく薬です。自己判断で薬を止めたり量を変更したりすると、症状の悪化や再発につながります。指示された量を守り、毎日きちんと飲み続けましょう。

●次のような症状が急にあらわれたときは医師または薬剤師にご相談ください

全身がだるい、食欲がない、皮膚や白目が黄色くなる、全身の皮疹や発疹、動悸、多汗、下痢や便秘

〔このほかにも気になる症状があらわれたときには
医師または薬剤師にご相談ください。〕

●医師の指示に従い、定期的に受診しましょう

痛風や高尿酸血症の治療は継続することが大切です。定期的に診察を受けながら、根気よく治療を続けましょう。

東和薬品株式会社