

使用上の注意改訂のお知らせ

2022 年 6 月

東和薬品株式会社

降圧利尿剤

日本薬局方
フロセミド錠
フロセミド錠40mg「トーフ」

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、改訂内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（_____：追記）

改 訂 後			改 訂 前		
3. 相互作用 2) 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 2) 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アリスギレン	併用投与（空腹時）により本剤のC _{max} を49%、AUCを28%減少させる ¹⁾ 。併用する場合は、利尿作用の低下をモニタリングし、必要に応じて本剤の投与量を調節すること。	機序不明	(該当する記載なし)		
【主要文献】 1) Vaidyanathan S., et al. : Cardiovasc. Ther., 2008 ; 26(4) : 238-246			【主要文献】 (該当する記載なし)		

2. 改訂理由

「相互作用 併用注意」の項（自主改訂）

フロセミド製剤のCCDS（企業中核データシート）が変更されたため、改訂いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.309（2022 年 7 月）に掲載の予定です。

最新の電子添文は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<https://www.pmda.go.jp>）及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>）に掲載いたします。

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

☎0120-108-932