

ダサチニブ錠「トーフ」を 服用される患者さんにご家族の方へ

この薬は、チロシンキナーゼ阻害作用のある抗悪性腫瘍剤で、白血病細胞の増殖に必要な異常なたんぱく質の働きを選択的に阻害して、白血病細胞の増殖を抑えます。自分の判断で服用をやめたり、量を加減したりせず、担当の医師の指示どおりに服用し続けることが大切です。

薬を服用する前に確認すること

次のような方はこの薬を服用することができません。

- 過去にダサチニブ錠に含まれている成分で過敏症を経験したことがある人
- 妊娠又は妊娠している可能性のある女性

次のような方は服用する前に必ず担当の医師または薬剤師に伝えてください。

- 以前にお薬を服用してかゆみや発疹などのアレルギー症状を経験したことがある人
- 間質性肺疾患にかかったことがある人
- 肝臓の機能が低下している人
- 心電図に異常がある人
- 心臓に疾患がある人
- 授乳中の人
- 他にお薬などを使っている人（一般用医薬品や食品を含む）

薬の服用中に気をつけること

- 必ず担当の医師に指示された服用方法にしたがってください。
- かまずにそのまま服用してください。

（裏面もお読みください）

続き

薬の服用中に気をつけること

- 飲み忘れた場合は、次の通常飲む時間に1回分を飲んでください。次回からも決められた時間に飲んでください。**絶対に2回を一度に服用してはいけません。**
- 担当の医師の指示なしに、**自分の判断で飲むのを止めないでください。**
- 効果や副作用を確かめるために必ず定期的に受診してください。
- この薬の服用中は「**グレープフルーツジュース**」や「**セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)**」を含む食品」を避けてください。

副作用について

- この薬を服用していると、下記のような副作用があらわれることがあります。症状に気が付きましたら担当の医師または薬剤師に相談してください。

吐き気、嘔吐

下痢

発疹・かゆみ

発熱・悪寒

貧血
けん怠感

筋痛

内出血
出血しやすい

むくみ
体重増加

せき
のどの痛み

- 上記以外でも気になる症状が出た場合は、担当の医師又は薬剤師に相談してください。

東和薬品株式会社

2022年6月作成 (C-1)
DC-002781_01