


イバンドロン酸静注シリンジ「トーワ」 による治療を受けられる患者さんへ

この薬は**月1回**、

通院して注射を受ける骨粗しょう症の薬です。

骨粗しょう症の治療は**継続することがとても重要**です。

月1回、医療機関を受診し、きちんと治療を続けましょう。



次回の注射日は 月 日 です

骨粗鬆症—治療・セルフケアのポイント—

については、こちらもご参考にしてください。



(裏面もお読みください)

次の方はこの薬による治療ができません

- この薬に含まれる成分またはビスホスホネート系薬剤で、アレルギーなどの過敏症が出たことがある方
- 低カルシウム血症のある方
- 妊娠している方、妊娠している可能性のある方、授乳中の方



以下のような症状があらわれたときは、
ただちに医師または薬剤師に連絡してください。

- | | |
|--------------|----------|
| ● 筋肉や関節などの痛み | ● 歯のゆるみ |
| ● 発熱 | ● あごの痛み |
| ● からだがだるい | ● 歯ぐきの腫れ |

歯科治療を受けられる方へ

- 抜歯などの歯の治療を受ける場合は、あらかじめ医師または薬剤師に相談してください。
- 歯科医、口腔外科医にイバンドロン酸の注射を受けていることを必ず伝えてください。

施設名

東和薬品株式会社