




エスシタロプラム錠/OD錠「トーワ」

を服用される患者さんとご家族の方へ



東和薬品株式会社

1 エスシタロプラム錠/OD錠とは

この薬は、うつ病やうつ状態を改善する薬です。
服用後に脳内に作用し、神経伝達物質のバランスを整えることによって、症状を和らげます。

3 この薬の服用方法

○1日1回夕食後に

○決められた錠数を

○水またはぬるま湯と一緒に

服用してください。



2 この薬の服用前の注意点

次のような場合には、この薬を使用することができません。
服用する前に、必ず主治医に相談をしてください。

- ① 以前エスシタロプラム錠/OD錠「トーワ」に含まれる成分で、アレルギーなどの過敏症が出たことがある方。
- ② セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシリ酸塩、サフィナミドメシリ酸塩を服用中、あるいは服用中止後14日以内の方。
- ③ ピモジドを服用中の方。
- ④ QT延長のある方(先天性QT延長症候群など)
—現在、心臓の病気(不整脈、狭心症、心筋梗塞、心不全)の治療を受けていたり、今まで心電図検査で何らかの指摘を受けたりしたことがある方は、主治医にお伝えください。

OD錠は水なしでも飲むことができます。

- ・舌の上で唾液を含ませ軽くつぶしてから唾液と一緒に飲み込んでください。
- ・水なしで飲むときは、寝たままで飲まないでください。
- ・普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。どちらの飲み方でも効き目は変わりません。



他の薬を服用している場合や、
新たに服用する場合は、主治医に相談してください。

治療の効果とこの薬の副作用

※治療の効果(経過)は患者さんによって異なります。

この薬は、脳内に作用し、飲み続
けることでうつ症状を和らげます。

改善・回復



この薬の服用中にみられる主な副作用

このような副作用がみられた場合には、主治医に相談してください。

- 悪心 ● 眠気 ● 頭痛 ● 口の渇き ● めまい
- 倦怠感 ● 下痢 ● 腹部不快感 など

また、射精障害、射精遅延、性的な関心や性欲の低下などの症状がみられることもあります。これらの症状を自覚された場合には、主治医や薬剤師に相談してください。

この薬を服用しているときには、
次のようなことに注意してください。

① 飲み忘れないように毎日夕食後にきちんと飲みましょう

飲み忘れても、一度に2回分を飲まないでください。間違えて多く飲みすぎてしまったときには、主治医に連絡してください。

② 定期的に診察を受けましょう。

うつ病の治療中は、薬の効果の確認や副作用を早くみつけるためにも、定期的に診察を受けてください。

③ 「治った」と感じても、飲み続けましょう。

うつ病の症状が少しずつよくなると、「治った」「回復した」と感じるときがあります。このような場合でも、自分の判断でお薬の服用をやめたり、量を減らしたりすると、些細なことでも心配になる、いらいら、あせりなどの症状があらわれることがあります。主治医と相談しながら指示どおりに飲み続け、最後まで治療を続けてください。



**④ 不安感が強くなり死にたいと思うなどの
症状があらわれた場合は、主治医に相談しましょう。**

うつ病やうつ状態の人は死んでしまいたいと感じることがあります。この薬を飲んでいる間、特に飲みはじめや飲む量を変更したときに、このような症状がでることがあります。

**⑤ 敵意を持つ、攻撃的になるなどの症状が
あらわれた場合は、主治医に相談しましょう。**

この薬との関連性は明らかではありませんが、敵意を持つ、攻撃的になる、衝動的に行動する、じっとしていることができないなどの症状があらわれた人の中には、うつ症状などが悪化する場合や、死んでしまいたいと感じたり、他人に対して危害を加えたりする場合があります。

**⑥ ご家族の方は、患者さんの状態を観察し、
変化がみられた場合は主治医に相談しましょう。**

ご家族の方は、患者さんの状態が④、⑤のように変化する可能性について、主治医から十分に説明を受け、患者さんをよく観察してください。また、患者さんご自身も症状に変化があったと感じた場合にはご家族の方に伝えるようにしてください。