


フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液


27.5 μ g「トーフ」56噴霧用・120噴霧用を使用される方へ

よりよい効果を得るために毎日継続して使いましょう。


- この使用説明書をよく読んで使用してください。
- 医師に指示された用法・用量を守って使用してください。
- 容器の先端の噴霧口を針やピンなどで突かないでください。破損し、噴霧できなくなります。



新しい容器を使い始めるとき



容器をよく振ってください。



空打ちを10回程度行い、
液が霧状になったことを確認してください。
(次回以降、空打ちは不要です。)


◆ 準備

1




使用前に鼻をよくかんで、
鼻の通りをよくしてください。

2



容器を矢印の方向に
よく振ってください。

[薬液のイメージ写真]



3日間放置後の薬液の状態




3



キャップをはずし、
イラストのように
しっかりと持ってください。

よく振ることにより、
サラサラの液体になり、
正しく噴霧できます。
使用前には毎回、必ず
よく振りましょう。



よく振った後の薬液の状態

裏面もお読みください

◆ 噴霧

用法：15歳以上

1日1回左右の鼻腔に2噴霧ずつ



少しうつむいた姿勢で、ノズルの先を鼻腔に入れ、左右の鼻腔に1回ずつ噴霧してください。



薬が鼻の奥まで行きわたるように、鼻から息を吸って口から吐いてください。



もう一度、左右の鼻腔に1回ずつ噴霧してください。



薬が鼻の奥まで行きわたるように、鼻から息を吸って口から吐いてください。

用法：15歳未満

1日1回左右の鼻腔に1噴霧ずつ



少しうつむいた姿勢で、ノズルの先を鼻腔に入れ、左右の鼻腔に1回ずつ噴霧してください。



保護者が行う場合は、イラストのように噴霧してください。



薬が鼻の奥まで行きわたるように、鼻から息を吸って口から吐いてください。

本剤は2歳未満の幼児等に対する安全性が確立していません(国内における使用経験がありません)。

◆ 噴霧の後

- 使用後はティッシュペーパーなどで容器の先端を拭いて、キャップをしてください。
- 直射日光を避け、室温で保管してください。
- 56回または120回噴霧後も薬液が残っています。(規定回数以上噴霧すると正常に噴霧されない場合があります。)
- 使い終わった後は各自治体により定められたルールに従って破棄してください。(プラスチック容器)