

ファムシクロビル錠250mg「トーフ」

再発性の単純疱疹(口唇ヘルペスまたは性器ヘルペス) の治療を受けられる方へ

次のような再発の初期症状があらわれた場合、症状出現後速やかに(6時間以内) お薬を服用してください。

- ☐ 痛み(チクチク・ヒリヒリなど)
※ただし、性器ヘルペスの排尿時の痛みは含まない。
- ☐ むずむずするような違和感
- ☐ かゆみ
- ☐ 腰の痛みや違和感(性器ヘルペスの場合)
これらは、単純疱疹の再発時に一般的にみられる症状です。

● 医師の指示どおりに、お薬を服用してください。

- ☐ 2回服用指示の場合、1回目の服用から約12時間後に2回目を服用してください。

12時間後が就寝中の場合は、6～18時間後の範囲で就寝前又は起床後に服用してください。

※お身体の状態により1回服用指示の場合もあります。

● 再発の初期症状出現後、速やかに服用できるよう、お薬は常に携帯してください。



初期症状出現後
速やかに
(6時間以内)



1回目

お薬を常に携帯し、チクチクなどの初期症状を感じたらなるべく早めに1回目のお薬を飲む

12時間後を目安に
(6～18時間後)



2回目

12時間後を目安(就寝中となる場合は6～18時間後の範囲)に2回目のお薬を飲む

裏面もお読みください

- 服用中、服用後に気になる症状があらわれた場合や異常(症状の増悪を含む)を感じた場合は、放置せず、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- 再発の初期症状出現後6時間以内にお薬を服用できなかった場合で、治療を希望される方は、医療機関を受診してください。
- 妊娠中または妊娠している可能性がある方、授乳中の方は、お薬を服用せず医師に相談してください。

お薬の保管・携帯に関する注意

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光を避けて室温(1～30℃)で保管・携帯してください。光により変色することがあります。変色したお薬は、服用しないでください。
- 使用期限を過ぎたお薬は服用しないでください。

このほかにも気になることやわからないことがある場合は
医師または薬剤師に相談してください。