


ファムシクロビル錠250mg

「トーフ」保管袋

再発性の単純疱疹

(口唇ヘルペス・性器ヘルペス)

に対する治療を受けられる方へ



- ① 再発の初期症状を感じたら速やかに（6時間以内に）お薬（4錠）を飲んでください。
- ② 1回目の服用から約12時間後に2回目のお薬（4錠）を飲んでください。

詳細は裏面をご参照下さい▶

- ・この袋のチャックをしっかりと閉じ、直射日光を避けて室温（1～30℃）で保管・携帯してください。光により変色することがあります。変色したお薬は、服用しないでください。
- ・使用期限を過ぎたお薬は服用しないでください。

使用
期限

東和薬品株式会社

注意事項

- 以下のような再発の初期症状を感じた場合、再発の初期症状出現後速やかに（6時間以内）お薬を服用してください。
 - ▷ 痛み（チクチク・ヒリヒリなど）
※ただし性器ヘルペスの排尿時の痛みは含まない。
 - ▷ むずむずするような違和感
 - ▷ かゆみ
 - ▷ 腰の痛みや違和感（性器ヘルペスの場合）
注）上記の例は、再発時に一般的に認められる症状です。
- 医師の指示どおりに、お薬を服用してください。
2回服用指示の場合、1回目の服用から約12時間後に2回目を服用してください。
12時間後が就寝中の場合は、6～18時間後の範囲で服用してください。
※お体の状態により1回服用指示の場合もあります。
- 再発の初期症状出現後、速やかに服用できるよう、お薬は常に携帯してください。
- 妊娠または妊娠している可能性がある場合、授乳中の場合は、お薬を服用せずに医師に相談してください。
- 服用中、服用後に気になる症状があらわれた場合や異常（症状の増悪を含む）を感じた場合は、放置せず、すぐに医師・薬剤師に相談してください。また、再発の初期症状出現後6時間以内にお薬を服用できなかった場合で、治療を希望される方は、医療機関を受診してください。