

セフカペンピボキシシル塩酸塩細粒 小児用10%「トーフ」の上手な飲ませ方

監修：獨協医科大学 小児科学 主任教授 吉原重美 先生

このお薬は抗生物質です。
医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

このお薬はいちご風味です

- ・甘みをつけた、いちご風味のお薬です。水と一緒に飲ませてください。
- ・このお薬は苦みを防いだ細粒ですので、つぶさないで飲ませてください。



飲みにくい場合は少量の水に混ぜて飲むこともできます

- ・このお薬は、水に溶けませんが混ざります。
 - ・少量の水（20ccぐらい）を入れ、軽くかき混ぜてすぐに飲ませてください。
- ※ 飲ませる直前に1回分を混ぜて使用してください。
混ぜたお薬は保存しないでください。



飲ませた後のポイント

このお薬は甘く味付けされていますが、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。すぐに水を飲ませてあげるとよいでしょう。

このお薬に含まれる白色の粒について

- ・このお薬には白色の粒が含まれていることがありますが、品質には問題ありません。

裏面もお読みください

セフカペンピボキシシル塩酸塩細粒 小児用10%「トーフ」の上手な飲ませ方

監修：獨協医科大学 小児科学 主任教授 吉原重美 先生

このお薬は抗生物質です。
医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

このお薬はいちご風味です

- ・甘みをつけた、いちご風味のお薬です。水と一緒に飲ませてください。
- ・このお薬は苦みを防いだ細粒ですので、つぶさないで飲ませてください。



飲みにくい場合は少量の水に混ぜて飲むこともできます

- ・このお薬は、水に溶けませんが混ざります。
 - ・少量の水（20ccぐらい）を入れ、軽くかき混ぜてすぐに飲ませてください。
- ※ 飲ませる直前に1回分を混ぜて使用してください。
混ぜたお薬は保存しないでください。



飲ませた後のポイント

このお薬は甘く味付けされていますが、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。すぐに水を飲ませてあげるとよいでしょう。

このお薬に含まれる白色の粒について

- ・このお薬には白色の粒が含まれていることがありますが、品質には問題ありません。

裏面もお読みください

セフカペンピボキシシル塩酸塩細粒 小児用10%「トーフ」の上手な飲ませ方

監修：獨協医科大学 小児科学 主任教授 吉原重美 先生

このお薬は抗生物質です。
医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

このお薬はいちご風味です

- ・甘みをつけた、いちご風味のお薬です。水と一緒に飲ませてください。
- ・このお薬は苦みを防いだ細粒ですので、つぶさないで飲ませてください。



飲みにくい場合は少量の水に混ぜて飲むこともできます

- ・このお薬は、水に溶けませんが混ざります。
 - ・少量の水（20ccぐらい）を入れ、軽くかき混ぜてすぐに飲ませてください。
- ※ 飲ませる直前に1回分を混ぜて使用してください。
混ぜたお薬は保存しないでください。



飲ませた後のポイント

このお薬は甘く味付けされていますが、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。すぐに水を飲ませてあげるとよいでしょう。

このお薬に含まれる白色の粒について

- ・このお薬には白色の粒が含まれていることがありますが、品質には問題ありません。

裏面もお読みください

セフカペンピボキシシル塩酸塩細粒 小児用10%「トーフ」の上手な飲ませ方

監修：獨協医科大学 小児科学 主任教授 吉原重美 先生

このお薬は抗生物質です。
医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

このお薬はいちご風味です

- ・甘みをつけた、いちご風味のお薬です。水と一緒に飲ませてください。
- ・このお薬は苦みを防いだ細粒ですので、つぶさないで飲ませてください。



飲みにくい場合は少量の水に混ぜて飲むこともできます

- ・このお薬は、水に溶けませんが混ざります。
 - ・少量の水（20ccぐらい）を入れ、軽くかき混ぜてすぐに飲ませてください。
- ※ 飲ませる直前に1回分を混ぜて使用してください。
混ぜたお薬は保存しないでください。



飲ませた後のポイント

このお薬は甘く味付けされていますが、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。すぐに水を飲ませてあげるとよいでしょう。

このお薬に含まれる白色の粒について


- ・このお薬には白色の粒が含まれていることがありますが、品質には問題ありません。

裏面もお読みください

水で飲みにくいときは…



水のかわりに少量のアイスクリームやココアなどと混ぜると、飲みやすくなります。



飲ませた後のポイント

飲みやすくする食品で飲ませたとしても、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。すぐに水を飲ませてあげるとよいでしょう。



次のような飲食物と混ぜると、苦みが増すことがあります。



保管について

光や湿気を避けて、室温で保存してください。


東和薬品株式会社

2023年6月改訂(DC-003362_01))

水で飲みにくいときは…



水のかわりに少量のアイスクリームやココアなどと混ぜると、飲みやすくなります。



飲ませた後のポイント

飲みやすくする食品で飲ませたとしても、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。すぐに水を飲ませてあげるとよいでしょう。



次のような飲食物と混ぜると、苦みが増すことがあります。



保管について

光や湿気を避けて、室温で保存してください。


東和薬品株式会社

2023年6月改訂(DC-003362_01))

水で飲みにくいときは…



水のかわりに少量のアイスクリームやココアなどと混ぜると、飲みやすくなります。



飲ませた後のポイント

飲みやすくする食品で飲ませたとしても、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。すぐに水を飲ませてあげるとよいでしょう。



次のような飲食物と混ぜると、苦みが増すことがあります。



保管について

光や湿気を避けて、室温で保存してください。


東和薬品株式会社

2023年6月改訂(DC-003362_01))

水で飲みにくいときは…



水のかわりに少量のアイスクリームやココアなどと混ぜると、飲みやすくなります。



飲ませた後のポイント

飲みやすくする食品で飲ませたとしても、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。すぐに水を飲ませてあげるとよいでしょう。



次のような飲食物と混ぜると、苦みが増すことがあります。



保管について

光や湿気を避けて、室温で保存してください。

東和薬品株式会社

2023年6月改訂(DC-003362_01))