

体重別小児投与量早見表

カルボシステインDS50%「トowa」

体重 (kg)	有効成分として		DSとして	
	1回量(mg) (10mg/kg)	1日量(mg) 〔1日3回〕	1回量(g) (0.02g/kg)	1日量(g) 〔1日3回〕
4	40	120	0.08	0.24
6	60	180	0.12	0.36
8	80	240	0.16	0.48
10	100	300	0.20	0.60
12	120	360	0.24	0.72
14	140	420	0.28	0.84
16	160	480	0.32	0.96
18	180	540	0.36	1.08
20	200	600	0.40	1.20
22	220	660	0.44	1.32
24	240	720	0.48	1.44
26	260	780	0.52	1.56
28	280	840	0.56	1.68
30	300	900	0.60	1.80
32	320	960	0.64	1.92
34	340	1,020	0.68	2.04
36	360	1,080	0.72	2.16
38	380	1,140	0.76	2.28
40	400	1,200	0.80	2.40

【用法・用量】(一部抜粋)

通常、幼・小児にL-カルボシステインとして体重 kg 当たり 1 回 10mg(本剤 0.02g)を用時懸濁し、1 日 3 回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

●その他の詳細につきましては製品添付文書をご参照ください●