リバルエン®LAパッチを使用される方へ

医師の指示に従って正しく使用して下さい。

- この説明書は大切に保管して下さい。
- 処方された患者さん以外はお使いにならないようお願いします。

リバルエンLAパッチは、皮膚から有効成分が吸収される貼り薬（パッチ剤）で、軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行を遅らせるはたらきがあります。
この薬は、皮膚に貼ると長い時間、成分が少しずつ放出されるように工夫されています。放出された薬の成分は皮膚を通って少しずつ体内に吸収され、血液の流れに乗って脳ではたらきます。

薬の使用スケジュールについて

- この薬は、**1回1枚貼付し、1週間に2回、決めた曜日**に貼りかえます。
- 医師の判断で貼付する薬の量を変更する場合がありますので、必ず医師の指示通りに貼ってください。

初回	2回目	3回目	4回目	
月曜日	金曜日	月曜日	金曜日	5回目以降も交互に繰り返す
火曜日	土曜日	火曜日	土曜日	
水曜日	日曜日	水曜日	日曜日	
木曜日	月曜日	木曜日	月曜日	
金曜日	火曜日	金曜日	火曜日	
土曜日	水曜日	土曜日	水曜日	
日曜日	木曜日	日曜日	木曜日	

あなたの貼りかえる日は
毎週（　　）曜日と（　　）曜日 です。

この薬の使い方

はじめに

- 貼りかえる曜日を決めます。
  - ・1週間に2回、1回1枚、同じ時間に薬を貼りかえます。
  - ・貼りかえはお風呂やシャワーのあとにするとよいでしょう。

【包装袋の活用】
・包装袋には、貼る日（貼付日）や貼る曜日を記入することができます。
また、あいているスペースには名前を記入することもできます。



貼る場所

背中、上腕、胸のいずれかの正常な皮膚に貼ります。
貼る場所は毎回変え、同じ場所に続けて貼らないでください。

【貼る場所の注意】
・清潔で乾燥した場所、体毛が少ない場所、密着した衣服を着用してもこすれにくい場所に貼ってください。
・傷や湿疹、皮膚炎などがある場所には貼らないでください。
・クリーム、ローション、パウダー、軟膏などをぬったばかりの場所ははがれやすくなります。乾いた場所に貼りましょう。



貼る前の準備

① 新しい薬を用意します。
　・貼付日を記入している場合は、今日の日付・曜日が記入された薬を用意してください。
② 前の薬をはがします。
　・**新しい薬を貼る前に、必ず前の薬をはがしてください。**一度に2枚以上貼らないでください。
　・前の薬は、皮膚を傷つけないよう、ゆっくりとやさしくはがしてください。一気にはがさないようにしてください。
　・使い終わったパッチは、まだ成分が残っているため、接着面を内側にして折りたたみ、子どもの手の届かないところや目につかないところに捨ててください。
③ 貼る場所を乾いたタオルなどでふいて、清潔にします。水分や汗をよく取り除いてください。

（裏面もお読みください）

貼り方

1

包装袋から薬を取り出す

内部のパッチを傷つけないように、包装袋の2ヵ所を番号順(①→②)に手で切り取り、中のパッチを取り出してください。手で切り取ることが難しい場合は、ハサミを使用して点線に沿って切って開封してください。

2

曜日または日付を記入する

パッチ表面に、左図のようにペンで記入して、
(貼った日)⇒(貼りかえる日)
が分かるようにしてください。

※水性ペンはにじむことがあるため、油性ペンでご記入ください。

3



透明フィルムを半分はがす

パッチには透明フィルムがついています。粘着面に触れないように、透明フィルムの半分をはがしてください。

※一度山折りすると、透明フィルムがはがれやすくなります。

4



薬を貼る

粘着面を背中、上腕、胸のいずれかに押しあて、半分だけパッチを貼ってください。
貼った部分を押さえて、残りの透明フィルムをはがしながら貼ってください。

5



薬を押さえる

パッチがしっかりとくっつくまで、手のひらで押さえてください。

6

手を洗う

パッチを貼り終わったら、石鹸で手を洗ってください。

手に薬がついていることもあるため、手を洗う前に目や口に触れないようにしてください。

使用時の注意点

【貼っている間の注意】

- 車の運転や危険を伴う機械の操作はしないでください。

【貼り忘れたときの注意】

- 貼り忘れに気づいたときは、気づいた時点で新しい薬を貼ってください。
  次からは、いつもと同じスケジュールで貼りかえてください。
- 貼り忘れに気づいても2枚以上を一度に貼ってはいけません。
- 4日間以上貼っていない期間がある場合は、次に使うパッチの大きさが変わることがありますので、医師にご相談ください。

【はがれそうなとき、はがれたときの注意】

- はがれそうなときは、再度手で押さえて貼ってください。押さえてもはがれそうなときは、市販の医療用テープで固定してください。
- 完全にはがれたときは、新しい薬に貼りかえてください。その後はあらかじめ決めた曜日に新しい薬に貼りかえてください。
- はがれた薬は、接着面を内側にして折りたたみ、子どもの手の届かないところや目につかないところに捨ててください。

薬の保管方法

- 子どもの手の届かないところや目につかないところで、高温を避けて保管してください。
- 薬は折り曲げないでください。
- この薬は1枚ごとに包装されています。包装袋は、貼る直前まで開けないでください。
- 薬を家族や他の人にゆずってはいけません。

副作用について

- 主な副作用として、皮膚症状(薬を貼った場所が赤くなる、かゆくなるなど)や消化器症状(嘔吐、吐き気、下痢など)が報告されています。
- 気になる症状が現れた場合は、医師又は薬剤師に相談してください。

東和薬品株式会社

2025(DC-004737_01)