


リバルエンLAパッチの使い方

監修 医療法人社団養生館 青葉病院 院長 石崎 賢一 先生・看護部 氏井 江理子 先生

- この薬は
【1回1枚】【1週間に2回】【決めた曜日】に
貼りかえます

- 包装袋に名前、曜日や日付を
書き込むことができます



- パッチにも
曜日や日付を書き込むことができます

リバルエンLA
51.84mg


貼付期間

(7/2) ⇒ (7/6)


リバルエンLA
25.92mg

貼付期間

(月) ⇒ (金)



貼る場所




- 背中・上腕・胸のいずれかに貼ります
- 貼る場所は毎回変え、同じ場所に続けて貼らないでください
- 一度に2枚以上貼らないでください
- 傷や湿疹、皮膚炎などがある場所には貼らないでください

貼りかえる曜日に○を書きましょう

- デイサービスなどのサービスの曜日に合わせるとわかりやすいです

日	月	火	水	木	金	土

- 忘れてしまいそうな場合には、
ご自宅のカレンダーに目印をつけたり、
スマートフォンのリマインダー機能なども
ご活用ください





貼り忘れたとき、はがれたときは


- 貼り忘れに気づいたとき、完全にはがれたときは、気づいた時点で新しい薬を貼ってください
その後は、あらかじめ決めた曜日に新しい薬に貼りかえてください
- はがれそうなときは、再度手で押さえて貼ってください
押さえてもはがれそうなときは、市販の医療用テープで固定してください

皮膚障害を予防するために

- 同じ場所に続けて貼らない
- やさしくゆっくりはがす



- 清潔で乾燥した場所に貼る
(水分や汗をよく取り除いてください)
- 風呂上がりに保湿剤をぬる
(皮膚が湿っているときに保湿剤をぬると効果的です)
- 新しい薬を貼ったあと、貼った部位を避けて保湿剤をぬる
(薬がうまく貼れなくなりますので、貼る直前に貼る場所やその周囲にはぬらないでください)



保湿剤の種類

ヘパリン類似物質製剤

その他(白色ワセリン、セラミドなど)

副作用について

- 主な副作用として、皮膚症状(薬を貼った場所が赤くなる、かゆくなるなど)や消化器症状(嘔吐、吐き気、下痢など)が報告されています
- 気になる症状が現れた場合は、医師又は薬剤師に相談してください