

プラスゲレル錠/OD錠「トーフ」を 服用される方へ

この薬は、血栓をできにくくして、血管がつまるのを防ぐ薬です。

服用にあたっての注意点

- 1日1回医師の指示通り、毎日きちんと服用してください。
- 自分の判断で中止したり、服用回数を減らしたりすることは絶対にしないでください。
- 服用し忘れた場合には、気づいたときにすぐに服用してください。ただし、次の服用時間が近い場合には1回分お休みして、次の服用時間から通常通り1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に服用しないでください。

以下のような症状があらわれた場合や、心配なことがある場合は、遠慮しないで医師にご相談ください。


- | | |
|--|--|
| ☐ 頭痛 | ☐ 悪心・嘔吐 |
| ☐ 意識が低下する | ☐ 手足が動きにくくなる |
| ☐ 血痰・吐血 | ☐ 尿が茶色っぽくなる、血が混じる |
| ☐ あざができる（紫色・赤色） | ☐ ぶつぶつができる |
| ☐ 眼や皮膚が黄色くなる | ☐ 倦怠感（強い疲労感） |
| ☐ 食欲がなくなる | ☐ 黒色便や便に血が混じる |

他の病院や診療科、歯科を受診するときは、
この薬を服用していることを
必ず医師・歯科医師・薬剤師にお伝えください。

この薬を服用している間は、
血が止まりにくいいため、出血に注意が必要です。
医師や薬剤師の指示を守ってください。

出血時の応急処置

●外傷で出血したとき



手指やタオルなどでグッと
おさえる（圧迫止血）

●鼻血が出たとき



うつむいて鼻をおさえる

血が止まらないときや出血が気になるときは、
自分だけで判断しないで、医師に連絡してください。

出血を避けるために

- ケガのおそれのある仕事や運動は慎重に行うようにしましょう
- 転倒に注意しましょう（階段の上り下りは手すりにつかまるように）
- 鼻をかむときはやさしくかみましょう
- ヒゲを剃るときは電気シェーバーを使いましょう
- 歯ブラシは柔らかめを使いましょう

東和薬品株式会社