

抗血小板剤

転院用

プラスグレル錠「トーフ」を 服用されている方へ

この用紙を転院先の医師にお見せください。

(患者さんの氏名)

______さんは、
現在、プラスグレル錠「トーフ」を以下の用量で
服用しています。

用 量：1日1回 3.75mg 2.5mg
(いずれかを○で囲んでください)

服用開始日： 年 月 日

病・医院名：

TEL： ()

東和薬品株式会社

2025年12月作成 (DC-005852_01)

この薬は、血栓をできにくくして、 血管がつまるのを防ぐ薬です。

この薬を服用している間は、血が止まりにくいいため、
出血に注意が必要です。

- 血が止まらないときや出血が気になるときは、
自分だけで判断しないで、医師に連絡してください。
- 他の病院や診療科、歯科を受診するときは、この薬を服用している
ことを必ず医師・歯科医師・薬剤師にお伝えください。

服用にあたっての注意点

- 1日1回医師の指示通り、毎日きちんと服用してください。
- 自分の判断で中止したり、服用回数を減らしたりすることは
絶対にしないでください。
- 服用し忘れた場合には、気づいたときにすぐに服用してください。
ただし、次の服用時間が近い場合には1回分お休みして、
次の服用時間から通常通り1回分を服用してください。
絶対に2回分を一度に服用しないでください。

以下のような症状があらわれた場合や、心配なことが
ある場合は、遠慮しないで医師にご相談ください。

- | | |
|--|--|
| ☐ 頭痛 | ☐ 悪心・嘔吐 |
| ☐ 意識が低下する | ☐ 手足が動きにくくなる |
| ☐ 血痰・吐血 | ☐ 尿が茶色っぽくなる、血が混じる |
| ☐ あざができる（紫色・赤色） | ☐ ぶつぶつができる |
| ☐ 眼や皮膚が黄色くなる | ☐ 倦怠感（強い疲労感） |
| ☐ 食欲がなくなる | ☐ 黒色便や便に血が混じる |