

オセルタミビルDS「トーフ」 の飲ませ方



バナナ風味の甘みがあるお薬です。



- 水に1回分のお薬を入れて、よくかき混ぜて飲ませてください。
- 作り置きせず、飲ませる直前に混ぜてください。
- お薬を飲み残すことのないよう、飲みきれる量に混ぜてください。



裏面には飲食物に混ぜたときの味の変化をご紹介します。

ご家族の方へのお願い

- ・お薬は湿気を避けて涼しい所に保存してください。
- ・誤って飲んでしまわないよう、お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・異常行動による転落等の事故を予防するために、発熱から少なくとも2日間は、就寝中を含め、容易に住居外へ飛び出さないように、ドアや窓の鍵を確実にかけるなど、対策を講じてください。

「めでいさぽきっず」では
年齢や成長に合わせたお薬の飲ませ方を
ご紹介しています。



オセルタミビルDS「トーフ」を 飲食物と混ぜたときの飲食物の味の変化*

このお薬を混ぜても味の変化があまり見られなかったもの



乳酸菌
飲料



リンゴ
ジュース



オレンジ
ジュース



バニラ
アイス



ココア

このお薬を混ぜると甘みが増したもの



ミネラル
ウォーター



スポーツ飲料



チョコ
アイス



ヨーグルト
(イチゴ味)

*: 飲食物、飲食物にこのお薬を混ぜたもの、それぞれについて味覚センサーを用いて甘味・塩味・酸味・苦味・旨味のスコアを測定し、人が認識できるスコアの変化を評価した(味覚センサーレオ調べ)。

味覚変化を評価した結果であり、水以外の飲食物と混ぜて服用することを積極的に推奨するものではありません。
実際の味覚には個人差があります。

東和薬品株式会社